

Papaver rhoeas (Mák vlčí)

synonyma: *Papaver commutatum*, *Papaver insignitum*, *Papaver intermedium*, *P. subsp. strigosum*, *P. var. strigosum*, *Papaver roubiaei*, *Papaver strigosum*, *Papaver tenuissimum*, *Papaver trilobum*, *Papaver tumidulum*

čeleď: *Papaveraceae*

oblasti: Afrika, Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kréta, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a severní Africe jako jednoletka (i dvouletka). Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 0,9 (i 1,2)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý, větvený, ochlupený a při poranění roní mléko. Vytváří 2 druhy listů, spodní jsou řapíkaté, dlouhé do 15cm, široké 6cm, horní přisedlé, menší, oba 1 - 2x peřenodílné, špičaté a s pilovým okrajem. Kvete na (10 -) 15 - 30cm stopce, zpravidla ochlupené, vlastní květy jsou červené nebo růžové (i bělavé) s černou skvrnou na bázi, průměrem (3 -) 4 - 8cm, korunní lístky jsou okrouhlé a široké 2 - 4 (i 5)cm. Plodem je kulovitá až široce obvejčitá tobolka (makovice) délky 1 - 2cm, šířky mírně menší a obsahuje mnoho drobných tmavě hnědých až černých semen.. Používá se v léčitelství. Dříve býval jako plevel na polích, dnes se ho podařilo zpravidla už vytlačit. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *rhoeas* - odstálé chlupy na květní stopce
- var. *strigosum* - přitisklé chlupy na květní stopce

Vyhovují mu zejména rumišťe, násypy nebo obilná pole s hlinitou půdou.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>