

Brassica tournefortii

synonyma: B. var. sisymbrioides

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arizona, Egypt, Írán, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Nevada, Nové Mexiko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Texas, Tunisko, Turecko

Roste v Evropě jako jednoletka. Dorůstá výšky (10 -) 30 - 50 (i 70)cm. Stonek je v horní části zpravidla větvený a ve spodní části ochlupený. Přízemní listy jsou v růžici, dlouhé (3 -) 6 - 19cm, tvoří je (4 -) 6 - 9 (i 12) párů podlouhlých segmentů, horní listy jsou chudé, podlouhlé až čárkovité, mohou být zubaté, špičaté, dlouhé 1 - 3cm a široké 4 - 8mm. Květenstvím je 10 - 20tkvětý hrozen dosahující v době plodu délky až 30cm, vlastní květy jsou světležluté, průměru 4 - 7mm, mají 2 - 6 (i 9)mm stopku protahující se v době plodu na až 2cm, kališní lístky jsou dlouhé 3 (i 4)mm, široké 1,5mm, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé (4,5 -) 4,8 - 6 (i 7)mm a široké 1,5mm. Plodem je úzce podlouhlá šešule délky (3,5 -) 4,6 - 6,5 (i 7)cm, šířky 2 - 3 (i 3,2)mm a obsahuje mnoho semen délky 1,2mm a průměru 1mm.

<https://www.rostliny.net/>