

Cucumis prophetarum

synonyma: Cucumis amarus, Cucumis arabicus, Cucumis foetidus, Cucumis mascatensis, Cucumis rheedei

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov, Balúčistán, Indie, Írán, Sindh

Roste od severní Afriky, přes Arabský poloostrov po Indii a Pakistán v podobě rozkladité plazivé trvalky. Stonek je ochlupený. Listy jsou vejčitékulovité, 3 (i 5)laločné, zubaté nebo laločnaté, dlouhé 2 - 4cm, na bázi srdčité až uťaté a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Samčí květenství je (1 -) 2 - 3květé, má 0,5 - 1cm stopku, kališní trubka má délku 3 - 5mm, laloky čárkovité, dlouhé 1,5mm, koruna je dlouhá 3 - 5mm, laloky úzce vejčité, zahrocené, samičí květy vyrůstají samostatně ne 2 - 3cm stopce a kalich i koruna se podobá samčím. Plody jsou zelenobíle pruhované, později žluté, dlouhé 3 - 4cm, široké 2 - 3cm a obsahují podlouhlá až eliptická semena délky 4mm a šířky 2mm.

<https://www.rostliny.net/>