

Achillea filipendulina (Řebříček tužebníkovitý)

synonyma: Achillea eupatorium, Achillea filicifolia, Tanacetum angulatum

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Irák, Írán, Kalifornie, Kavkaz, Kyrgyzstán, Michigan, New York, Ontario, Pákistán, Turecko, Utah, Vermont

Roste od Turecka po Afganistán a Pákistán v trsech. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří bohatě větvenou kořenovou hlavu tloušťky 0,5 - 1cm, ale bez delšího plazivého oddenku. Povrch je ochlupený. Stonky jsou vzpřímené. Listy jsou šedozelené, podlouhlé, dlouhé 10 - 20cm, široké 3 - 7cm, spodní dlouhé do 5cm, široce řapíkaté, široce 1 - 2x peřenodílné až peřenosečné s primárními vejčitými páry délky 1 - 2cm, šířky 0,5 - 1cm. Květenstvím je chocholičnatá lata průměru 4 - 9 (i 15)cm složená z 15 - 30tičetných disků ze žlutých úborů, zákrovy jsou dlouhé 4mm, široké 2,8mm a lůžko po odkvětu je nápadně prodloužené, korunu tvoří 2 - 4 korunní žluté lístky délky 0,7 - 1mm, šířky 1,3 - 1,5mm se 3mi laloky na vrcholu. Vydává výrazné aroma. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cloth of Gold' - květy žluté
- 'Coronation Gold' - výška 80cm
- 'Gold Plate' - výška 1,2m; listy zelené; chocholík ploché, žluté, průměru 10 - 15cm
- 'Parker' - květy žluté
- 'Parker's Variety' - květy žluté

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná sušší půda.

Množí se dělením.

<https://www.rostliny.net/>