

## Achillea nobilis (Řebříček sličný)

synonyma: *Achillea camphorata*, *Achillea corymbifera*, *Achillea cylindrica*, *Achillea decipiens*, *Achillea eridania*, *Achillea fruticulosa*, *Achillea gerberi*, *Achillea gerberi* var. *angustifolia*, *Achillea grata*, *Achillea hispanica*, *Achillea ligustica*, *Achillea ochroleuca*, *Achillea odorata*, *Achillea paucidentata*, *Achillea pectinata*, *Achillea pubescens*, *Achillea punctata*, *Achillea schkuhrii*, *Chamaemelum achilleum*, *Chamaemelum gerberi*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Katalánsko, Minnesota, Montana, Německo, Švýcarsko

Dorůstá výšky (15 -) 30 - 60cm. Střední a horní lodyžní listy 1,5 - 3 (i 4)x delší než široké, 3x přetřhaně peřenosečné (střídají se menší a větší úkrojky). Kvete bílými květy v úboru, zákrovní listeny zpravidla ochlupené, max. mírně lesklé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *densissima*
- subsp. *neilrerichii*
- subsp. *nobilis* (Řebříček sličný pravý)

Vyhovují mu skalní stepi, okraje teplých doubrav, paseky, atp.

<https://www.rostliny.net/>