

Zamia lecointei

synonyma: *Zamia jirijirimensis*, *Zamia obidensis*, *Zamia ulei* subsp. *lecointei*

čeleď: *Zamiaceae*

oblasti: Kolumbie, S Brazílie, Venezuela

Roste na jihu Kolumbie, Venezuely a Brazílie. Kmínky jsou podzemní, hlízovité, starší exempláře rozvětvené, dlouhé 20cm, široké 5 - 8cm. Listy vyrůstají zpravidla po 2 - 4ks, jsou dlouhé 1,5m, široké 56 - 70cm, zpeřené, tvořené 30 - 39ti páry lístků, vlastní lístky jsou dlouze kopinaté, mohou být srpovité, zašpičatělé, na vrcholu mohou být 2 - 3 zuby, dlouhé 30 - 37cm, široké 1 - 1,5 (i 2)cm a řapíky jsou dlouhé 50 - 62cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně (i po 2ks), jsou vzpřímené, válcovité, dlouhé 12 - 15cm, široké 4 - 5cm, mají 10 - 14cm stopky, samčí šištice vyrůstají po několika ks, jsou dlouhé 7 - 10cm, široké 2 - 3cm a mají 6 - 8cm stopky.

<https://www.rostliny.net/>