

Gentiana prostrata

synonyma: Chondrophylla prostrata, Ciminalis prostrata, Ericala nutans, Ericala prostrata, Ericoila prostrata, Gentiana sedifolia var. splendens, Gentianusa flava, Hippion prostratum, Varasia sedifolia

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Afganistán, Alberta, Aljaška, Bhútán, Britská Kolumbie, Idaho, Írán, Itálie, Kalifornie, Kolorado, Maďarsko, Montana, Nepál, Nevada, Oregon, Pákistán, Rakousko, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Sikkim, Švýcarsko, Turkestán, Utah, Wyoming, Xizang (Tibet), Yukon

Roste v Rakousku, Maďarsku, Sibiři, Afganistánu, Íránu, Turkestánu, Pakistánu, Tibetu, Indii a Bhútánu jako jednoletka. Dorůstá výšky 2 - 6cm. Stonek je od báze větvený. Přízemní listy v růžici v počtu 4 (i 5)ks jsou lžičkovité až široce obvejčité, dlouhé 3 - 6mm, široké 1 - 3mm, lodyžní listy jsou obvejčitě lžičkovité, dlouhé 3 - 5 (i 6)mm a široké 1,5 - 3mm; květy samostatné, dlouhé 1,1 - 2,5cm, mají až 1,5mm stopku, kalich dlouhý 1 - 1,5cm, hnědočervený, trubka je dlouhá 0,7 - 1,25cm, laloky kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 0,75 - 1mm, koruna má délku 1 - 2,2cm, trubka je dlouhá 0,7 - 1,3cm, laloky vejčité, špičaté a dlouhé 2 - 2,5mm a široké 0,5 - 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. crenulatotruncata
- var. karelinii/Ciminalis karelinii - Pakistán, Čína, Nepál, Indie; jednoletka; stonek již i od báze větvený, ochlupený; přízemní listy v růžici, vejčité až lžičkovité, dlouhé 4 - 6mm, široké 2 - 3mm, lodyžní lístky úzce vejčité až obvejčité, lžičkovité, zubaté, zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 6 (i 7)mm a široké 0,5 - 2,5mm; květy samostatné, přisedlé, dlouhé 1,2 - 2,2cm, kalich okřídlený, dlouhý 1 - 1,5cm, zelený, trubka dlouhá 0,75 - 1,2cm, laloky kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna dlouhá 1,2 - 2,2cm, trubka dlouhá 0,8 - 1,4cm, laloky kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 3,5mm a široké 0,75 - 1,5mm
- var. ludlowii
- subsp. nutans
- var. pudica

<https://www.rostliny.net/>