

# Cotyledon orbiculata

synonyma: *Cotyledon ambigua*, *Cotyledon ausana*, *Cotyledon canaliculata*, *Cotyledon decussata*, *Cotyledon elata*, *Cotyledon ergleri*, *Cotyledon mucronata*, *C. f. dinteri*, *Cotyledon papillaris*, *Cotyledon ramosa*, *Cotyledon ramosissima*, *Cotyledon tricuspidata*, *Cotyledon ungulata*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Angola, Francie, JZ Austrálie, Kalifornie, Kapsko, Lesotho, Mosambik, Namibie, Nový Zéland, Svazijsko, Tasmánie

Roste v JAR v podobě stálezeleného sukulentního od báze větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,3 (i 1,5)m. Listy jsou umístěné na vrcholcích, jsou vstřícné nebo přeslenité, obvejčité, kopinaté nebo čárkovité, zaoblené až špičaté, lesklé, povrch může být ochlupený, dlouhé 3 - 16cm, široké 1 - 5 (i 9)cm a pokud má dostatek přímého slunečního světla, jsou okraje červené. Květenství může být ochlupené, dlouhé 0,2 - 1m (stopky jsou dlouhé 10 - 70cm), vlastní květy jsou převislé, červené až oranžové (i žluté), průměru 2 - 3 cm, kališní lístky dlouhé 2 - 5mm a koruna je dlouhá 0,7 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dactyloopsis* - výška do 50cm; listy vstřícné; květy žluté s dlouhými laloky
- var. *flanaganii* - výška do 1m; listy 3četně přeslenité, kulaté
- var. *oblonga* - kmínky od báze větvené, poléhavé (i vzpřímené); listy vstřícné; květy červenooranžové
- '*Oophylla*'/var. *oophylla*/'*Boegeberg*' - výška (bez květu) 15cm; listy jsou voskovité, našedlé, na okraji růžovofialové; květy růžovočervené
- var. *orbiculata* - výška do 1m; listy vstřícné, špičaté, voskovité, okraj červený; květy tmavěčervené až oranžové
- var. *spuria* - výška do 1,5m; kmínky občas poléhavé; květy žlutooranžové (i červené)

Vyhovují jí písčité či kamenité dobře propustné půdy a nízká zálivka. Snáší pokles teploty až k 5°C a snad toleruje nejspíše i mírné mrazy.

<https://www.rostliny.net/>