

# Zamioculcas (Kulkas)

čeleď: Araceae

Existuje pouze 1 druh.

## Zamioculcas zamiifolia (Kulkas zamiolistý)

synonyma: *Caladium zamiaefolium*, *Zamiacaulcas zamiafolia*, *Z. lanceolata*, *Z. loddigesii*

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal, Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zanzibar, Zimbabwe

Pochází z tropické východní Afriky, její areál zasahuje od Keni po JAR, dále na Maskarénách (ostrov Bourbon) a Zanzibaru. Pod zemí vytváří sukulentní kořen sloužící jako zásobárna vody. Dorůstá do výšky (30 -) 45 - 60 (i 80)cm. Sudozpeřené listy dorůstají délky 0,4 - 0,6 (i 1)m, báze je lahvovitá přecházející řapík, vlastní lístky jsou párovité, vejčité kopinaté, tmavězelené, lesklé a dlouhé 7 - 15cm. Květenství tvoří bílý toulec s palicí na 3 - 20cm dužnaté stopce. Plodem je zploštělá bobule obsahující 1 - 2 zploštělá oválná semena s hnědou slupkou a délkou 8mm.

Nevadí krátkodobé přelití (musí být opravdu krátké) nebo naopak sucho (které může být i delší). Optimální je mírná zálivka (stačí jednou za 2 - 3 týdny) kombinovaná s rosením. Světlo by mělo být jasné, ne však z přímého slunce. Teplota přezimování by se měla pohybovat v rozmezí 15 - 18°C a zaléváme pak až v okamžiku, kdy substrát proschne. Nikdy by neměla by klesnout pod 12°C. V době léta postačí teplota 18 - 26°C. Přesazujeme jej 1x za rok do substrátu složeného ze stejného poměru drnovky, listovky, rašeliny a písku. Hnojíme 1x za dva týdny v období od dubna do srpna.

Množíme pupenovými řízků, listovou čepelí a dělením.

Další informace:

<http://www.celysvet.cz/zamiokulkas.php>

<http://www.hobbyzahrada.cz/data/clanek.asp?id=1182>

<https://www.rostliny.net/>