

Ananas (Ananasovník)

čeleď: Bromeliaceae

Pochází ze střední a Jižní Ameriky. Patří mezi trvalky. Listy vytvářejí růžici ze širokých sukulentních listů se zubatým okrajem a ostrou špičkou a z ní vyrůstá listnatá lodyha zakončená strboulkovitým květenstvím z hustých zpravidla červenofialových květů podepřených tuhým listenem. Plodenství je šiškovité. Je jednou z mála sukulentních rostlin, které člověk dokáže využít pro sebe. Jednoznačně nejznámější je *A. comosus*, který znáte z obchodů s potravinami. Ostatní druhy ananasů sice tvoří plody také, ale kromě aroma a pevných vláken v listech nemají jiný užitek.

Vyhovuje mu plné slunce s nadýchanou půdou bohatou na živiny. Není mrazuvzdorný.

Množí se odnožemi nebo řízkem z chocholu listů na vrcholu plodenství.

Ananas ananassoides

synonyma: *Acanthostachys ananassoides*, *A. comosus* var. *ananassoides*, *A. comosus* var. *microstachys*, *A. guaraniticus*, *A. sativus* var. *microstachys*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Kostarika

Pochází z Bolívie, Brazílie a Kostariky.

Ananas bracteatus

synonyma: *A. bracteatus* var. *macrodontes*, *A. bracteatus* var. *rudis*, *A. bracteatus* var. *striatus*, *A. bracteatus* var. *tricolor*, *A. comosus* var. *bracteatus*, *A. comosus* var. *rudis*, *A. comosus* var. *tricolor*, *A. genesio-linsii*, *A. sativus* var. *bracteatus*, *Ananassa bracteata*, *Ananassa sagenaria*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Dorůstá výšky 1m. Listy vytvářejí přízemní růžici, mají růžové zoubkaté okraje následované ke středu žlutou linkou a střed je zelený. Květenství má velikosti 15cm, listeny jsou červené, vlastní květy jsou růžovofialové až červené. Plodenství je malé a oranžové. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *tricolor*/'Tricolor' - listy na okraji bílobéžové a panašované

Ananas comosus (Ananasovník chocholatý)

synonyma: *A. ananas*, *A. argentata*, *A. aurata*, *A. bracteatus*, *A. bracteatus* var. *hondurensis*, *A. bracteatus* var. *paraguayensis*, *A. coccineus*, *A. comosus* f. *sativus*, *A. comosus* var. *variegatus*, *A. debilis*, *A. domestica*, *A. maxima*, *A. monstrosus*, *A. ovatus*, *A. pancheanus*, *A. penangensis*, *A. porteanus*, *A. pyramidalis*, *A. sativa*, *A. sativus*, *A. sativus* var. *hispanorum*, *A. sativus* var. *muricatus*, *A. sativus* var. *pyramidalis*, *A. sativus* var. *variegatus*, *A. sativus* var. *viridis*, *A. serotinus*, *A. viridis*, *Ananassa ananas*, *Ananassa debilis*, *Ananassa portearia*, *Ananassa sativa*, *Bromelia ananas*, *Bromelia ananas* var. *prolifera*, *Bromelia communis*, *Bromelia comosa*, *Bromelia mai-pouri*, *Bromelia pigna*, *Bromelia rubra*, *Bromelia violacea*, *Bromelia viridis*, *Distiacanthus communis*

oblasti: Brazílie, Florida, Kostarika, Mexiko, Portoriko, Venezuela

Roste na savanách Venezuely v podobě mnohaleté bylinky, ale pěstuje se v teplých oblastech celého světa. Dorůstá výšky 0,75 (i 1,5)m a šířky 1,2m. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou tuhé, čárkovité, ostře zubaté, dlouhé do 90cm a široké 6cm. Ze středu vyrůstá kvetenství na 30 - 50cm stonku nesoucí až 200 modrofialových nebo bílých oboupohlavných květů. Plody jsou v závislosti na odrůdě těžké 0,5 - 5 kg, dužnina je bílá nebo žlutá, velmi šťavnatá, téměř vždy bezsemenná. Většina odrůd je autosterilních a tvoří partenokarpické plody. Plodenství má na vrcholu růžici krátkých 40 - 50 tence mečovitých listů, která se používá pro množení. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Porteanus' - listy mají žlutobílé podélné pruhy, občas načervenalé
- var. *variegatus*/'*Variegatus*' (Ananas pravý pestrý) - má bílé okraje se zoubky, zelený střed se slabou bílou linkou

V našich podmínkách skleníkového či bytového pěstování vyžaduje propustný a na živiny bohatý substrát s každodenní závlahou s dostatkem slunečního svitu a vlhka. Pak se nám odmění v krátké době plodenstvím. A. je snad jediná rostlina, která kterou lze donutit zakvést uměle. Hnojíme 1x za 14 dní tekutými hojivy pro broméliovité rostliny.

Rozmnožujeme tak, že plodovou růžici, která nesmí být zvadlá, odřežeme i s kouskem dužiny. První mladé listy otrháme, odřežeme dužinu i s 2milimetrovou částí růžice. Řeznou ránu zasypeme práškovým stimulátorem nebo rozdrceným dřevěným uhlím. Necháme zaschnout alespoň dva týdny při teplotě 22 až 25°C. Připravíme si zavařovací sklenici, kterou do jedné třetiny naplníme směsi vláknité rašeliny a agroperlitu v poměru 1:1 a růžici zapíchneme asi 2 cm po listy. Růžici rosíme a substrát mírně zalijem. Sklenici přikryjeme mikroténovým sáčkem s malými otvory. Zakořenování trvá 4 - 12 týdnů při teplotě 25 - 28°C. Ideálním obdobím jsou Vánoce, kdy můžeme sklenici umístit na radiátor.

Ananas erectifolius

Má pestře zbarvené listy.

Ananas fritzmuelleri

synonyma: *A. bracteatus* var. *albus*, *A. comosus* var. *albus*

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Ananas lucidus

synonyma: *A. bracamorensis*, *A. comosus* f. *lucidus*, *A. comosus* var. *erectifolius*, *A. erectifolius*, *A. glaber*, *A. mordilona*, *A. prolifer*, *A. proliferus*, *A. sativus* f. *mordilona*, *A. sativus* var. *duckei*, *A. sativus* var. *lucidus*, *A. semiserratus*, *Ananassa bracamorensis*, *Ananassa lucida*, *Ananassa mordilona*, *Ananassa semiserrata*, *Bromelia ananas*, *Bromelia ananas* var. *beta*, *Bromelia ananas* var. *inermis*, *Bromelia ananas* var. *king-pineapple*, *Bromelia glabra*, *Bromelia inermis*, *Bromelia lucida*, *Bromelia semiserrata*, *Bromelia subspinosa*

oblasti: Ekvádor, Venezuela

Pochází z Venezuely a Ekvádoru. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'Chocolat'

- 'Selvagem'

Ananas nanus

synonyma: A. ananassoides var. nanus, A. microstachys var. nanus

Ananas parguazensis

synonyma: A. comosus var. parguazensis

oblasti: Venezuela

Pochází z Venezuely.

Ananas sagenaria

synonyma: A. bracteatus var. sagenarius, A. macrodontes, A. microcephalus, A. microcephalus var. major, A. microcephalus var. minor, A. microcephalus var. missionensis, A. microcephalus var. mondayanus, A. microcephalus var. robustus, A. sativus var. macrodontes, A. sativus var. sagenarius, A. silvestris, Bromelia macrodosa, Bromelia sagenaria, Bromelia silvestris, Bromelia undulata, Pseudananas macrodontes, Pseudananas sagenarius, Pseudananas sagenarius var. macrodontes

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Paraguay

Roste v Argentině, Bolívii, Brazílii, Ekvádoru a Paraguayi.

Další informace:

<http://citrusykiwi.wz.cz/ananas.html>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ananas>

<http://www.citrusy.cz/2001113017-pestovani-ananasu>

http://www.denik.cz/moje_hobby/ananas20070609.html

<http://www.tropichukvaldy.cz/textyrostvni.htm>

<https://www.rostliny.net/>