

Aloe arborescens (Aloe stromovitá)

synonyma: Aloe arborea, A. var. frutescens, A. var. milleri, A. var. natalensis, A. var. pachystyrsa, A. var. viridifolia, Aloe frutescens, Aloe fruticosa, Aloe fulgens, Aloe natalensis, Aloe perfoliata var. arborescens, Aloe perfoliatum, Aloe principis, Aloe salm-dyckiana, Aloe salm-dyckiana var. fulgens, Aloe sigmoidea, Catevala arborescens, Pachidendron principis

čeleď: Liliaceae

oblasti: Andalusie, Baleáry, Botswana, Francie, Free State, J Korea, J Nový Zéland, Japonsko, Jižní Austrálie, JZ Mexiko, Kapsko, Katalánsko, KwaZulu-Natal, Makaronésie, Malawi, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Nový Jižní Wales, Portugalsko, Střední Mexiko, Střední střeozemí, Svazijsko, Transvaal, Tunisko, Zimbabwe

Roste od JAR po Malawi, Mosambik a Zimbabwe v podobě rozvětveného keře nebo malého stromu a zavlečená byla i jinde. Dorůstá výšky (0,6 -) 2 - 3 (i 5)m. Stonek je dřevnatějící, od báze štíhle větvené a vytváří velké množství růžic. Listy vyrůstají v růžicích na koncích větví, jsou tuhé, křehké, krátce trnitě zubaté (i bělavé), zelené až modře zelené či šedě zelené, dlouhé 50 - 60cm, na bázi široké 5cm. Květenství má 60 (i 90)cm výšku z hustého kuželovitého hroznu délky 20 - 30cm, průměru 10 - 12cm, listy jsou vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,2cm, vlastní květy jsou červené až růžově oranžové, později žluté, velikosti 4 - 5cm. Má léčivé účinky, ne ale tak velké jako A. vera. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Compont'
- subsp. mzymnyati
- 'Pearson'
- 'Spineless' - namodralé listy s hladkým okrajem
- 'Variegata' - modrozelené zubaté listy s béžovými proužky

Potřebuje dostatek světla (ne přímé polední), teplo, čerstvý vzduch a suchý dobře propustný hlinitopísčítý substrát. Zimuje při teplotách 10 - 15°C. Zaléváme až po proschnutí substrátu, zato vydatně, stačí i 1x měsíčně. Přesazuje se cca 1x za 3 roky. Kupodivu ji lze pěstovat i hydroponicky.

Množí se vrcholovými řízkami nebo odnožemi.

<https://www.rostliny.net/>