

Plectranthus scutellarioides (Africká kopřiva)

synonyma: Calchas acuminatus, Calchas atropurpureus, Calchas crispipilus, Calchas scutellarioides, Calchas scutellarioides var. angustifolia, Calchas scutellarioides var. crispipilus, Calchas scutellarioides var. limnophila, Coleus acuminatus, Coleus atropurpureus, Coleus atropurpureus var. densiflorus, Coleus atropurpureus var. javanicus, Coleus atropurpureus var. ramosus, Coleus blancoi, Coleus blumei, Coleus crispipilus, Coleus formosanus, Coleus gaudichaudii, Coleus gibbsiae, Coleus grandifolius, Coleus hybridus, Coleus igolotorum, Coleus ingratus, Coleus integrifolius, Coleus laciniatus, Coleus macranthus var. crispipilus, Coleus multiflorus, Coleus pubescens, Coleus pumilus, Coleus rehnelianus, Coleus savannicola, Coleus scutellarioides, Coleus scutellarioides var. angustifolia, Coleus scutellarioides var. blumei, Coleus scutellarioides var. celebicus, Coleus scutellarioides var. crispipilus, Coleus scutellarioides var. gibbsiae, Coleus scutellarioides var. gracilis, Coleus scutellarioides var. grandifolius, Coleus scutellarioides var. ingratus, Coleus scutellarioides var. integrifolius, Coleus scutellarioides var. laciniatus, Coleus scutellarioides var. laxa, Coleus scutellarioides var. limnophila, Coleus secundiflorus, Coleus verschaffeltii, Coleus x hybridus, Coleus zschokkei, Germanea nudiflora, Majana acuminata, Majana blancoi, Majana grandifolia, Majana multiflora, Majana pumila, Majana scutellarioides, Majana scutellarioides var. atropurpureus, Majana scutellarioides var. blumei, Majana secundiflora, Ocimum peltatum, Ocimum scutellarioides, Perilla nankinensis, Plectranthus aromaticus, Plectranthus blumei, Plectranthus ingratus, Plectranthus laciniatus, Plectranthus nudiflorus, Plectranthus scutellarioides, Solenostemon blumei, Solenostemon scutellarioides

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Afrika, Austrálie, Indie, Indonésie, J Mexiko, Malajsie, Srí Lanka

Pochází z jihovýchodní Asie. Dorůstá výšky 30 - 40 (i 60)cm. V okamžiku vykvetení ztrácejí listy na svém efektním atraktivním zbarvení. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Black Dragon' - tmavý hnědě červený zpeřený list
- 'Grown Jewel' - listy dlouze řapíkaté
- 'Kong' - větší listy
- 'Le Freak' - listy dlouze řapíkaté
- 'Presidio'
- 'Rainbow' - středně velký list; nečastější, barevná směs
- 'River Walk'
- 'Solento' - převislé
- 'Nevada'

- 'Spacecake'

Má rád hodně světla, ale ne přímé slunce. Také zálivka by měla být bohatá. V době zimy listy opadávají. Ideální přezimování je tedy bez listů při teplotě 10 - 16°C. Sází se do substrátu pro pokojové rostliny s pH 4,5 - 6. Nemá ráda delší dobu s vyschlou půdou. Hnojí se 1x za 14 dní. Pokud chcete docílit bohatého rozvětvení, musíte rostlinu seřezávat a vyštípat květy.

Množí se semeny nebo na jaře vrcholovými řízkami, které nejprve necháme vytvořit kořeny v nádobě s vodou a následně sázíme do květináče.