

Conophytum (Živé kameny)

čeleď: Aizoaceae

Pochází ze jižní a západní části jižní Afriky. Jsou to malé sukulenty rostoucí většinou ve skupinách. Párové listy bývají srostlé a řadíme je tak do skupiny tzv. Živých kamenů, kam patří spolu s rodem Lithops.

Letní teploty v našich zeměpisných šířkách C. vyhovují. Důležité je také umístění v dobře větrané místnosti a dostatek světla, ne však přímého slunečního. Přezimujte je při teplotách 13 - 14°C a za nízké vlhkosti bez zálivky. I v době léta zalévejte pouze mírně, vždy až při zcela vyschnutém substrátu, aby nedocházelo k zahánění kořenů. Také interval hnojení je delší než je obvykle u sukulentů doporučováno. Pouze 1x měsíčně. Přesazujte po 2 - 3 letech do malých širších mělkých květináčů s dobrou drenáží z písku. Jako složení substrátu se doporučuje poměr 1:1 listovky standardní zeminy nebo substrát prodáváný pro sukulenty. Pro pravděpodobné narušení kořenů nezalévejte 14 dní, aby se případné ranky stačily zacelit a nedošlo k zahánění.

Množíme je řízký mladých listů. Používejte ostrý nůž, aby řez byl rovný a čistý. Řez se zasype práškem fytohormonu a nechá se 2 dny zaschnout. Poté řízek položíte na substrát, jen mírně zahrnete a začnete zalévat po 3 týdnech, kdy by se již měly vyvinout malé kořínky.

Conophytum achabense

oblasti: J Afrika

Conophytum acutum

Conophytum albescens

oblasti: J Afrika

Má vejčité tělo s 2,5cm průměrem. Srostlé listy jsou šedozelené, z vrchu bíle tečkované a má žluté květy.

Conophytum albiflorum

synonyma: C. edwardsiae var. albiflorum

oblasti: J Afrika

Conophytum ampliatum

oblasti: J Afrika

Conophytum angelicae

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. tetragonum

Conophytum antonii

Conophytum armianum

Conophytum arscherii

Conophytum auctum

oblasti: J Afrika

Conophytum auriflorum

oblasti: J Afrika

Conophytum bachelorum

Conophytum bicarinatum

Conophytum bilobum

synonyma: *C. absimile*, *C. aequale*, *C. albescens*, *C. ampliatus*, *C. amplum*, *C. andausanum*, *C. angustum*, *C. anomalum*, *C. apiatum*, *C. apiculatum*, *C. approximatum*, *C. asperulum*, *C. auctum*, *C. auctum* f. *approximatum*, *C. australe*, *C. barkerae*, *C. brevisectum*, *C. cauliferum*, *C. christiansenianum*, *C. citrinum*, *C. compressum*, *C. conradii*, *C. convexum*, *C. cordatum*, *C. coriaceum*, *C. crassum*, *C. curtum*, *C. dennisii*, *C. difforme*, *C. dilatatum*, *C. dissimile*, *C. distans*, *C. divaricatum*, *C. diversum*, *C. dolomiticum*, *C. ecarinatum*, *C. elishae*, *C. excisum*, *C. exsertum*, *C. gonapense*, *C. gonapense* var. *numeesicum*, *C. inclusum*, *C. incurvum*, *C. indefinitum*, *C. insigne*, *C. klipbokbergense*, *C. lacteum*, *C. largum*, *C. lavisianum*, *C. laxipetalum*, *C. lekkersingense*, *C. leucanthum*, *C. linearilucidum*, *C. markoetterae*, *C. meyeriae*, *C. muscosipapillatum*, *C. nelianum*, *C. nutaboiese*, *C. obtusum*, *C. ovatum*, *C. parvulum*, *C. philipii*, *C. piriforme*, *C. plenum*, *C. pluriforme*, *C. pole-evansii*, *C. proximum*, *C. recisum*, *C. simile*, *C. simplum*, *C. sitzlerianum*, *C. smithersii*, *C. sororium*, *C. springbokense*, *C. strictum*, *C. stylosum*, *C. subacutum*, *C. subcylindricum*, *C. subtenuis*, *C. supremum*, *C. tectum*, *C. tumidum*, *C. umdausense*, *C. variabile*, *C. vlakmynense*, *Derenbergia apiata*, *Derenbergia biloba*, *Derenbergia caulifera*, *Derenbergia elishae*

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v trsech o šířce 20 - 25 (i 30)cm. Má zploštělé zelené až šedozelené srdčité tělo o průměru 2,5cm a dorůstá výšky (1 -) 5 (i 7)cm. Kvete žlutými (i bílými) květy o průměru 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. altum
- subsp. bilobum
- var. muscosipapillatum - výška 3,5cm, šířka až 4cm; dokáže vydržet nakrátko i teploty blížící se k 0°C; nekvete
- subsp. claviferens
- subsp. gracilistulum - stonky jsou měkké, dlouhé, tmavě tečkované; květy růžové; vyhovuje mu stín; dobře odnožuje
- 'Leucanthum'

Vyhovují mu skalnatá místa, snáší v létě sucho i plné slunce.

Conophytum blandum

oblasti: J Afrika

Conophytum bolusiae

synonyma: C. intrepidum

Conophytum breve

synonyma: C. membranaceum, C. pageae var. pygmaeum, C. paucipunctum, C. pumilum, C. pygmaeum, C. subtile

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v trsech. Stonky mají v průměru 5 - 8mm, vrchol se při dostatku slunce barví do červena a má štěrbinu, ze které vyrůstají květy. Kvete v noci úzce trubkovitými bílými až žlutooranžovými květy.

Conophytum brevisetum

oblasti: J Afrika

Conophytum brunneum

Conophytum burgeri

Conophytum calculus

synonyma: C. komkansicum

oblasti: J Afrika

Conophytum calitzdoreense

oblasti: J Afrika

Conophytum caroli

synonyma: *C. concordans*, *C. singulare*

oblasti: J Afrika

Conophytum carpianum

oblasti: J Afrika

Conophytum chauviniae

synonyma: *Derenbergia chauviniae*

oblasti: J Afrika

Conophytum chrisocruxum

Conophytum chrisolum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR jako samostatné rostliny. Dorůstá průměru 0,5 - 1cm. Během léta povrch mění na bílou papírovou schránku a s příchodem dešťů začíná kvést růžovými květy o stejném průměru, jako je tělo.

Vyhovuje mu rozptýleno světlo a dostatek čerstvého vzduchu. Je náchylný na uhnívání.

Conophytum cineo-viride

oblasti: J Afrika

Conophytum comptonii

Conophytum concavum

Conophytum cubicum

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou čtvercové, šířky 1 - 1,5cm. Kvete bílými (i růžovými) květy s dlouhou trubkou.

Conophytum cytolinum

oblasti: J Afrika

Conophytum danielii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v 20 - 50tičetných trsech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Listy jsou kýlnaté, ochlupené, žlutozelené až zelené, na vrcholu červené, srostlé a oddělené pouze štěrbinou se sklovitým okrajem. Kvete růžovými květy s bílým středem o průměru 1 - 1,5cm.

Conophytum densipunctatum

Conophytum depressum

Conophytum devium

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. stiriiferum

Conophytum ectypum

synonyma: *C. chloratum*, *C. limbatum*, *C. tischleri*

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v trsech. Dorůstá výšky i šířky 1cm. Stonek je sytě tmavě zelený, občas s červenou kresbou na vrcholu. Kvete fialovými květy s protáhlou květní trubkou dlouhou až 5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brownii
- subsp. cruciatum - na povrchu jsou hluboké prohlubně
- subsp. sulcatum
- 'Umdaus'

Vyhovuje mu kamenitý podklad.

Conophytum ernstii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Druhové jméno bylo vybráno na počest objevitele Ernsta van Jaarsvelda (* 1953). Roste v JAR v trsech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Povrch je lesklý, hustě asymetricky drobně papilnatý a každým rokem se na vrcholu vytvářejí 3 nové stonky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. cerebellum

Vyhovují mu stinné svahy.

Conophytum ficiforme

synonyma: *C. altile*, *C. assimile*, *C. ficiforme* var. *placitum*, *C. fossulatum*, *C. odoratum*, *C. pallidum*, *C. placitum*

oblasti: J Afrika

Conophytum flavum

synonyma: *C. concinnum*, *C. flavum* var. *luteum*, *C. luteum*, *C. ornatum*, *C. percrassum*, *C. tetracarpum*, *C. tinctum*

oblasti: Namaqualand

Roste na skalách v Kapsku a Namaqualandu v JAR. Má zcela srostlé listy, mající šířku 1 - 2cm se zcela plochým vrcholem pokrytým tmavězelenými tečkami. Uprostřed se pouze nachází malá rýha, ze které vyrůstají žluté květy.

Conophytum fraternum

synonyma: *C. kubusanum*, *C. praecox*

oblasti: J Afrika

Conophytum fridrichae

oblasti: J Afrika

Tělo je vysoké 2,5cm. Listy má zcela srostlé, šedo zelené s tenkou světlou propustnou vrstvou a s tmavšími skvrnkami z horní strany. Květ je bílý s červenými konci a má 1,5cm v průměru.

Conophytum friedrichiae

synonyma: *C. renominatum*, *C. schwantesii*, *Derenbergia friedrichiae*

Conophytum frutescens

synonyma: *C. notabile*, *C. salmonicolor*, *C. teguliflorum*

oblasti: Namaqualand

Roste ve sparách skal v Namaqualandu v Jihoafrické Republice. Roste v až 30cm vysokých trsech. Květy mají sytou červenooranžovou barvu a vyrůstají uvnitř do V rozevřených z poloviny srostlých listů.

Conophytum fulleri

synonyma: *C. wiesemannianum*

oblasti: J Afrika

Conophytum globosum

synonyma: *C. obovatum*, *C. vanbredae*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Picturatum'

Conophytum gratum

synonyma: *C. admiraalii*, *C. doornense*, *C. geyeri*, *C. indutum*, *C. jacobsonianum*, *C. jucundum*, *C. longistylum*, *C. maximum*, *C. orbicum*, *C. praegratum*, *C. rarum*, *C. robustum*

oblasti: J Afrika

Conophytum halenbergense

synonyma: *C. cuneatum*, *Derenbergia halenbergensis*

Conophytum hammeri

Conophytum hanae

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v 30 - 50tičetných trsech. Tělo je zploštělé, klínovité, rozdělené pouze mělkou spárou, zelené až tmavězelené na vrcholku při dostatku slunce s červeným lemem, s průhlednými tečkami a délky 1,5 - 3cm. Kvete růžovými až fialovými květy s bílým středem a velikostí až 2,5cm. Plodem je hnědá tobolka s 5ti komůrkami.

Vyhovuje mu rozptýlené světlo a dobře propustný substrát.

Množí se semeny.

Conophytum hermarium

oblasti: J Afrika

Conophytum herreanthus

Conophytum hians

synonyma: *C. elongatum*, *C. hirtum*, *C. miserum*, *C. parvimarinum*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Monstruosum'

Conophytum hyracis

Conophytum immacratum

oblasti: J Afrika

Conophytum irmae

Conophytum jarmilae

Conophytum joubertii

synonyma: *C. viride*

Conophytum jucundum

synonyma: *C. gratum*

oblasti: Kapsko

Pochází z JAR. Dorůstá výšky 2,5cm a šířky 2cm. Listy jsou velmi zakulacené. Kvete fialovorůžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. fragile

- subsp. ruschii

Conophytum khamiesbergense

oblasti: J Afrika

Conophytum klinghardtense

Conophytum latum

oblasti: J Afrika

Conophytum limpidum

Conophytum literatum

Conophytum lithopoides

Conophytum lithopsoides

oblasti: J Afrika

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. koubergense
- subsp. boreale

Conophytum loescheanum

synonyma: *C. intermedium*, *C. rubricarinatum*, *C. saxetanum* var. *loeschianum*

oblasti: J Afrika

Conophytum longum

synonyma: *C. discretum*, *C. rawei*

oblasti: J Afrika

Conophytum luckhoffii

synonyma: *C. edwardsiae*

oblasti: J Afrika

Conophytum lydiae

synonyma: *C. haramoepense*, *C. spathulatum*

oblasti: J Afrika

Conophytum marginatum

oblasti: J Afrika

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. haramoepense
- 'Karamoepense'

Conophytum marnierianum

oblasti: J Afrika

Conophytum maughanii

synonyma: *C. rufescens*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. armeniacum
- subsp. latum - roste po 1 (i 2 - 3)ks; výška 0,8 - 1,5cm, šířka 2cm; tělo se ke zploštělému vrcholu s průhledným okénkem a zelenými tečkami na okraji zmenšuje; kvete v noci bílými až růžovými aromatickými květy
- subsp. maughanii - vrchol zakulacený

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustný substrát z křemene.

Conophytum meyeræ

synonyma: *C. meyeri*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Ovigerum'

Conophytum meyeri

synonyma: *C. candidum*, *C. corculum*, *C. ecarinatum* var. *candidum*, *C. extractum*, *C. globuliforme*, *C. laetum*, *C. laetum* var. *extractum*, *C. leopardinum*, *C. longibracteatum*, *C. meyeri* f. *semilunulum*, *C. meyeri* var. *globuliforme*, *C. meyeri* var. *ramosum*, *C. microstoma*, *C. nanum*, *C. niveum*, *C. ovigerum*, *C. papillatum*, *C. puberulum*, *C. ramosum*, *C. retusum*, *C. semilunulum*

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR.

Conophytum microstigmum

Conophytum minimum

synonyma: *C. albifissum*, *C. batesii*, *C. brevilineatum*, *C. labyrinthum*, *C. leviculum*, *C. notatum*, *C.*

obmetale, *C. pauxillum*, *C. perpusillum*, *C. petraeum*, *C. pictum*, *C. polulum*, *C. praecinctum*, *C. pusillum*, *C. radiatum*, *C. scitulum*, *C. signatum*, *C. vagum*, *C. wittebergense*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *wittebergense*

Conophytum minusculum

synonyma: *C. herrei*, *C. minusculum* f. *roseum*, *C. minusculum* var. *paucilineatum*, *C. minusculum* var. *reticulatum*, *C. reticulatum*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *aestiflorens*

Množí se semeny.

Conophytum minutum

synonyma: *C. minutum* f. *sellatum*, *C. minutum* var. *sellatum*, *C. sellatum*, *Mesembryanthemum minutum*

oblasti: Kapsko

Pochází v JAR v trsech ve skalních štěrbinách. Srostlé listy jsou 5 - 10mm široké a 1cm vysoké. Vrchní zploštělá strana listů je řídce pokrytá tmavými skvrnami. Kvete tmavšími fialovými květy s menším počtem okvětních lístů, než bývá u jiných druhů obvyklé. Květy mají v průměru 15mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *minutum* - tělo zpravidla tečkované
- var. *nudum* - stonky bez teček v drobných trsech
- var. *pearsonii* - 20 - 30tičetné trsy; tělo ploché, výška 1 - 3cm

Conophytum mirabile

Conophytum muirii

oblasti: J Afrika

Conophytum namaquanum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Conophytum nanum

oblasti: J Afrika

Má kulovité tělo v průměru 7mm. Listy jsou šedozelené, kvete bíle s červenými okraji s 1cm průměrem.

Conophytum noisabiense

Conophytum novicum

Conophytum obconellum

oblasti: J Afrika

Tělo má 2cm v průměru. Listy mají z horní strany maličké bílé tečkování. Kvete žlutě.

Conophytum obcordellum

synonyma: *C. declinatum*, *C. germanum*, *C. giftbergense*, *C. impressum*, *C. lambertense*, *C. longifissum*, *C. multicolor*, *C. mundum*, *C. nevillei*, *C. obconellum*, *C. obcordellum* f. *stayneri*, *C. obcordellum* f. *ursprungianum*, *C. obcordellum* var. *germanum*, *C. obcordellum* var. *mundum*, *C. obcordellum* var. *parvipetalum*, *C. parviflorum*, *C. parviflorum* var. *impressum*, *C. parvipetalum*, *C. picturatum*, *C. spectabile*, *C. ursprungianum*, *C. ursprungianum* var. *stayneri*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v trsech. Dorůstá velikosti 1 - 2cm. Stonky mají zploštělé vrcholy. Kvete v noci aromatickými bílými nebo růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ceresianum*/'*Ceresianum*' - kresba pouze v náznacích
- '*Mundum*'
- var. *obcordellum*/'*Picturatum*'/*C. picturatum* - výrazná tmavá kresba
- subsp. *rolfii*/'*Rolfii*' - kresba úzkými linkami s chloupky
- var. *stenandrum* - na vrcholu drobné hrboly a červené čárky

Conophytum obscurum

synonyma: *C. clavatum*, *C. pulchellum*

oblasti: J Afrika

Existují vnitrodruhové taxony:

- '*Barbatum*'
- subsp. *sponcaliorum*

Conophytum orbicum

oblasti: J Afrika

Conophytum oviferum

oblasti: J Afrika

Conophytum pageae

synonyma: *C. aequatum*, *C. forresteri*, *C. johannis-winkleri*, *C. labiatum*, *C. longipetalum*, *C. minutiflorum*, *C. pageae* var. *albiflorum*, *C. pauperae*, *C. poellnitzianum*, *C. productum*, *C. schickianum*, *C. subrisum*, *C. tenuisectum*, *C. thudichumii*, *C. udabihense*, *C. victoris*, *C. villetii*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou široké 1 - 4cm.

Vyhovuje mu rozptýlené světlo.

Conophytum pardicolor

oblasti: J Afrika

Conophytum pearsonii

oblasti: J Afrika

Tělo je kulovité, 1,5cm vysoké, listé téměř zcela srostlé s modrozelenou barvou. Květ má v průměru 2cm liliově růžové barvy.

Conophytum pellucidum

synonyma: *C. elegans*, *C. fenestratum*, *C. pardicolor*, *C. terricolor*

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR. Tělo má na vrcholu průměr 0,4 - 1cm. Je charakteristický různou kresbou a hrbolky na vrcholu listů. Ke své velikosti kvete velikými bílými květy se žlutým středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cupreatum* - zpravidla trsy; tělo eliptické, zakulacené, lesklé, zpravidla s mnoha průhlednými tečkami, měďnaté (v dormaci s hnědou až bílou slupkou), dlouhé 0,5 - 1cm, široké 4 - 7mm a rozdělené krátkou spárou; květy na 0,5 - 1,5cm stopce, bílé nebo růžové, průměru 1 - 1,5cm
- 'Terricolor'
- var. *lilianum*/'Lilianum' - květy růžové
- 'Neohallii'
- subsp. *pellucidum* - květy zpravidla bílé

Vyhovuje mu žulový nebo křemenný substrát, rozptýlené světlo, dobře propustný substrát a nízká zálivka.

Conophytum phoeniceum

Conophytum picturatum

oblasti: J Afrika

Conophytum pillansii

Conophytum piluliforme

synonyma: *C. advenum*, *C. aggregatum*, *C. archeri*, *C. brevipetalum*, *C. etaylorii*, *C. leightoniae*, *C. piluliforme* var. *advenum*, *C. piluliforme* var. *brevipetalum*, *C. subconfusum*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Arscherii'
- subsp. *edwardii*

Conophytum pium

Conophytum praesectum

Conophytum puberulum

oblasti: J Afrika

Conophytum pubescens

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR. Tělo je měkké, ochlupené, průměru 0,6 - 1,5cm, štěrbina bývá růžová a na vrcholku má průhledné zelené okénko. Kvete bílými, tmavě růžovými nebo fialovými květy o průměru 2 - 2,5.

V době dormance zatahují pod zem.

Conophytum pubicalyx

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v trsech i z několika stovek jedinců. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Tělo má průměr 1 - 2mm a okolí štěrbiny je průsvitné. Kvete v noci světleoranžovými až černočervenými květy.

Vyhovuje mu křemenný substrát, teplota 10 - 15°C, stín, dostatek čerstvého vzduchu a stín.

Conophytum quaesitum

synonyma: *C. modestum*, *C. quarziticum*, *Derenbergia quaesita*

oblasti: Namibie

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *densipunctum* - Namibie; tělo klínovité, světle žlutozelené, hustě tečkované, dlouhé 1 - 2cm, průměru 1cm; květy noční, bílé a aromatické

Přezimuje při teplotách 10°C.

Conophytum ramosum

oblasti: J Afrika

Conophytum ratum

Conophytum reconditum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR v trsech. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *buousianum* - mohutnější stonek, vrcholky hladké; květy fialové

- subsp. *reconditum* - JAR; těla jsou na severním okraji výskytu zelené a na jižním hnědé, laloky mají bradavičnaté vrcholky, stonky se každý rok dělí na 3 nové a osamostatňují se; květy bílé, velikosti 2 - 7mm

Vyhovuje mu teplo, dobře propustný substrát, rozptýlené světlo a sucho.

Conophytum regale

oblasti: J Afrika

Conophytum ricardianum

oblasti: Namibie

Roste v Namibii. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *rubriflorum*

Conophytum robustum

Conophytum rolfii

oblasti: J Afrika

Conophytum roodiae

synonyma: *C. cylindratum* var. *primosii*, *C. primosii*, *C. rubroniveum*

Conophytum rooillanense

oblasti: J Afrika

Conophytum rubrolineatum

oblasti: J Afrika

Conophytum rugosum

Conophytum saxetanum

synonyma: *C. exiguum*, *C. graessneri*, *C. misellum*, *C. namibense*, *C. saxetanum* f. *hallianum*, *C. saxetanum* var. *misellum*, *C. vescum*, *Derenbergia saxetana*

oblasti: J Afrika

Vytváří trsy s až 200 rostlinkami. Listy jsou 6 - 10mm vysoké a široké 5mm. Vrchní strana listů je posetá bílými skvrnami. Bílé květy vykvétají v noci a voní. Je velmi citlivý na zálivku. Potřebuje čerstvý vzduch. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Buchuberg'
- 'Beauvallon'

Conophytum schlechteri

oblasti: J Afrika

Conophytum scitulum

oblasti: J Afrika

Conophytum seitubum

oblasti: J Afrika

Conophytum semilunulum

oblasti: J Afrika

Conophytum semivestitum

Conophytum smorenskaduense

oblasti: J Afrika

Conophytum stephanii

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. helmutii

Conophytum stevens-jonesianum

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR. Kvete v noci.

Conophytum subfenestratum

synonyma: C. edithiae, C. lucipunctum, C. pillansii

oblasti: J Afrika

Conophytum subterraneum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR. Tělo je zelené, zpravidla vždy schované pod zemí. Kvete růžovými květy o průměru 2cm.

Vyhovuje mu dobře propustný křemenitý substrát.

Conophytum swanepoelianum

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. rubrolineatum

Conophytum sylk punctatum

oblasti: J Afrika

Conophytum tantillum

synonyma: *C. eenkokerense*

oblasti: J Afrika

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *helenae*
- subsp. *inexpectatum*

Conophytum taylorianum

synonyma: *C. lavranosii*, *C. lavranosii* var. *cuneatum*

oblasti: Namibie

Pochází z Namibie u hranic s JAR. Podobá se druhu *C. quaesitum*. Je ale větší, kratší s více skvrnami. Kvete v noci žlutookrovými květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *ernianum*

Conophytum truncatum

synonyma: *C. albertense*, *C. brevitubum*, *C. cibdelum*, *C. morganii*, *C. multipunctatum*, *C. orientale*, *C. parvipunctum*, *C. peersii*, *C. peersii* var. *multipunctatum*, *C. purpusii*, *C. renniei*, *C. spirale*, *C. stegmannianum*, *C. steytlerivillense*, *C. subglobosum*, *C. translucens*, *C. truncatellum*, *C. wagnerianum*, *C. wagneriorum*

oblasti: J Afrika

Conophytum turrigerum

synonyma: *Derenbergia turrigera*

oblasti: J Afrika

Conophytum udabibense

Conophytum uviforme

synonyma: *C. clarum*, *C. colorans*, *C. framesii*, *C. franciscii*, *C. hillii*, *C. julii*, *C. litorale*, *C. meleagris*, *C. pardivisum*, *C. praeparvum*, *C. praeparvum* var. *roseum*, *C. prolongatum*, *C. rooipanense*, *C. stipitatum*, *C. uviforme* f. *framesii*, *C. uviforme* f. *meleagris*, *C. uviforme* var. *clarum*, *C. uviforme* var. *litorale*, *C. vanrhynsdorpense*, *Mesembryanthemum uviforme*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. subincanum
- subsp. uviforme

Conophytum vanheerdei

Conophytum vanzijlii

Conophytum varians

Conophytum velutinum

synonyma: *C. craterulum*, *C. tischeri*, *C. velutinum* var. *craterulum*

oblasti: J Afrika

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. polyandrum/*C. polyandrum*

Conophytum verrucosum

oblasti: J Afrika

Conophytum violaciflorum

synonyma: *C. anjametae*

oblasti: J Afrika

Conophytum wettsteinii

synonyma: *C. brevipes*, *C. circumpunctatum*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Rodové jméno bylo vybráno na počest Richarda von Wettsteina (1863 - 1931). Roste v JAR v trsech. Stonky jsou zelené, lesklé, na vrcholu zploštělé a průměru 1 - 3cm. Kvete růžovými až červenofialovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. fragile
- 'Richtersveld'
- subsp. ruschii

Vyhovují mu křemenité skály a svahy.

Conophytum x cupreiflorum

Conophytum x marnierianum

Další informace:

<http://www.celysvet.cz/conophytum.php>

<http://www.palkowitschia.cz/sukulenty/cykly.htm>

<https://www.rostliny.net/>