

Aloe ferox

synonyma: Aloe candelabrum, A. var. galpinii, A. var. incurva, A. var. incurvata, A. var. subferox, Aloe galpinii, Aloe horrida, Aloe muricata, Aloe pallancae, Aloe perfoliata var. ferox, Aloe pseudoferox, Aloe subferox, Aloe supralaevis, Aloe supralaevis var. erythrocarpa, Busipho ferox, Pachidendron ferox, Pachidendron pseudoferox, Pachidendron supralaeve

čeleď: Liliaceae

oblasti: Francie, Free State, Kapsko, Katalánsko, KwaZulu-Natal, Lesotho

Roste v JAR a Lesothu v podobě nevětveného vzpřímeného stromu a zavlečená byla do Francie a Španělska. Dorůstá výšky 2 - 3,5 (i 5)m díky nevětvenému kmeni pokrytému na vrcholu odumřеныmi listy. Listy jsou v 50 - 60tičetnou růžici, jsou kopinaté, šedě zelené až namodralé, občas načervenalé, dlouhé 0,5 - 1m, široké 6,5 - 15cm, v mládí a s hnědě červenými trny (v dospělosti jsou pouze na okraji). Kvete v až 12ti vzpřímených jednobarevných hroznech délky 0,5 - 0,8 (i 1)m, šířky 9 - 12cm, vlastní květy jsou červené až oranžově červené (vzácně i bílé či narůžovělé), na špičce hnědé nebo bílé a dlouhé 3,3cm. Plodem je žlutě šedě hnědá tobolka délky 2 - 2,3cm, šířky 1 - 1,2cm obsahující 3 téměř černá semena délky 5mm, šířky 3mm a tloušťky 0,6mm.

Teplota by neměla klesnout pod 5°C. Doba klíčení semen se pohybuje mezi 3 - 4 týdny.

<https://www.rostliny.net/>