

## Iberis amara (Iberka hořká)

synonyma: *Biauricula amara*, *Biauricula resedifolia*, *Crucifera iberis*, *Iberis affinis*, *I. subsp. amara*, *I. subsp. forestieri*, *Iberis apricorum*, *Iberis arvatica*, *Iberis bicolor*, *Iberis bicorymbifera*, *Iberis contracta subsp. vinetorum*, *Iberis crenata*, *Iberis decipiens*, *Iberis forestieri*, *Iberis latifolia*, *Iberis martinii*, *Iberis montolivensis*, *Iberis panduraeformis*, *Iberis pinetorum*, *Iberis resedifolia*, *Iberis ruficaulis*, *Iberis sabauda*, *Iberis vinetorum*, *Thlaspi amarum*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Aljaška, Connecticut, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Německo, Nové Skotsko, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Švýcarsko, Velká Británie, Vermont, Západní Virginie

Roste v západní Evropě v podobě keře, ale rozšířila se široce po světě. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 25 (i 40)cm a šířky 15cm. Stonek je vzpřímený, větvený a ochlupený. Listy jsou jednoduché, spodní lžičkovité, zelené, horní kopinaté nebo podlouhlé. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou bílé nebo narůžovělé o průměru 1cm na 1cm stopce, korunní lístky jsou nestejně, vnější 2 téměř 2násobné délky kališních, dlouhé 0,5 - 0,8 (i 1)cm. Plodem je kulovitá okřídlená šišule průměru 5 (i 7)mm a obsahuje mírně ve spodní části okřídlená červenohnědá semena délky 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *amara*
- subsp. *forestieri*
- 'Iceberg'
- 'Monut Hood'
- 'White Pinnacle'

<https://www.rostliny.net/>