

Melissa officinalis (Meduňka lékařská)

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Albánie, Andalusie, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Delaware, Georgia, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Itálie, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Portugalsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tennessee, Turecko, Vermont, Virginie, Washington, Západní Virginie

Roste v západní Asii jako trvalka a odkud se přemístila do východního středozeší. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,6 - 1 (i 1,5)m. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Lodyha má tendenci poléhat, je 4hranná a bohatě větvená. Listy jsou řapíkaté, vstřícné, v oddálených lichopřeslenech, eliptické až vejčité, zašpičatělé, pilovité, ochlupené, dlouhé 2 - 8 (i 10)cm, široké 1,5 - 5 (i 7,5)cm, na bázi spodní srdčité, horní uťaté a povrch může být výrazně plastický. Kvete drobnými kvítky po 4 - 12 (i 14)ti v jednostranných lichopřeslenech v paždí listů, kalich má délku (0,6 -) 0,7 - 0,8 (i 1)cm, kališní lístky jsou 2pyské, horní je prakticky plochý, ohnutý vzhůru se 3mi zuby, spodní se 2mi a koruna je béžově bílá a dlouhá (0,8 -) 1 - 1,2 (i 1,5)cm. Plody po 4ks, jsou dlouhé 2mm a široké 1mm. Vydává citrónové aroma. Využívá se v léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. altissima
- 'Aurea' - žluté skvrny na listech
- subsp. inodora
- subsp. officinalis (Meduňka lékařská pravá)

Potřebuje hlinitopísčitou vlhkou půdu pokud možno na chráněném místě a plné slunce nebo jen mírný stín a teplo.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>