

Adiantum capillus-veneris (Netík venušin vlas)

čeleď: Pteridaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Černé moře, Egejské ostrovy, Egypt, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Afrika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Jordánsko, JV Asie, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Louisiana, Maďarsko, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Palestina, Portoriko, Portugalsko, Řecko, S Jižní Amerika, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tropická Afrika, Tunisko, Utah, Velká Británie, Virginie

Vyskytuje se ve středozeemí, jihozápadní Evropě, v Malé Asii, tropické Africe, Karibiku, Severní Americe, severu Jižní Ameriky, jihovýchodní Asii, Havaje a dokonce i v Austrálii jako trvalka. Dorůstá délky (10 -) 20 - 50 (i 70)cm. Vytváří krátké šupinaté oddenky. Listy jsou tmavěhnědě řapíkaté, mírně vejčité, dlouhé 5 - 30cm, 2 - 4x zpeřené, úkrojky jsou 3boké, asymetrické, bledězelené, asymetricky vroubkované, podvinuté a dlouhé 0,5 - 1cm.

Vyhovují mu vlhké skalní štěrbiny s vápenitým substrátem.

<https://www.rostliny.net/>