

## Cibotium (Cibot)

synonyma: Pinonia

čeleď: Cibotiaceae

Nové listy se rodí stočené do spirály a postupně se rozmotávají. Tento proces je velmi efektní. Vlastní listy jsou 1 - 3x lichozpeřené, lístky jsou ploché, na kraji zvlňené.

Vyhovuje jim studený skleník s vyšší vzdušnou vlhkostí. Při přímém slunci rychle odumírají. Nemají rádi suchý nebo starý vzduch. Letní teplota by se měla pohybovat v rozmezí 15 - 30°C, na zimu nesmí klesnout pod 7°C.

Množí se výtrusnicemi ve spórách.

### Cibotium arachnoideum

### Cibotium assamicum

### Cibotium barometz (Cibot hemostatický)

oblasti: Čína, Malajsie, SV Indie, Thajsko

Pochází z Číny, Indie a Malajsie. Roste v podobě stromovité kapradiny. Dorůstá výšky do 1m, ale délka listů může dosáhnout až 3m.

### Cibotium chamissoi

oblasti: Havajské ostrovy

### Cibotium cumingii

oblasti: Filipíny, Tchaj-wan

Pochází z horských oblastí Filipín a Tchaj-wanu.

### Cibotium glaucum

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z Havajských ostrovů. Patří ke stromovitým kapradinám. Délka listů dosahuje 1,5m a šířka 0,5m.

### Cibotium menziesii

oblasti: Havajské ostrovy

Roste jako endemit na Havaii. Dokáže dorůst až do 11m výšky s průměrem kmene 90cm. Je tedy také jasným zástupcem stromovitých kapradin. Délka listů dosahuje do 3,7m.

Množí se spórami.

### Cibotium nealiae

oblasti: Havajské ostrovy

### Cibotium regale (Cibot královský)

### Cibotium schiedeii (Cibocitum Schiedovo)

oblasti: Veracruz

Pochází z Mexika. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy dorůstají délky do 80cm.

### Cibotium sumatranum

### Cibotium x heleniae

oblasti: Havajské ostrovy

<https://www.rostliny.net/>