

Myrtus communis (Myrta obecná)

synonyma: *Myrtus augustinii*, *M. f. baetica*, *M. f. belgica*, *M. f. lusitanica*, *M. f. tarentinus*, *M. subsp. lusitanica*, *M. subsp. mucronata*, *M. var. adrianii*, *M. var. balearicus*, *M. var. baui*, *M. var. bercialis*, *M. var. camboanus*, *M. var. communis*, *M. var. eugeniae*, *M. var. gallachi*, *M. var. gausseni*, *M. var. gibertii*, *M. var. italica*, *M. var. jonssetii*, *M. var. latifolia*, *M. var. lusitanica*, *M. var. macrocarpa*, *M. var. melanocarpa*, *M. var. microphylla*, *M. var. morawieskiana*, *M. var. rodesii*, *M. var. soleri*, *M. var. theodori*

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozemí v podobě stálezeleného keře nebo nízkého stromu o výšce (1 -) 3 - 4 (i 5)m (u nás je obvyklá max. výška kolem 1m). Větve jsou 4hranné, v mládí bledě hnědé a žláznatě ochlupené. Listy jsou eliptické až vejčitě kopinaté, špičaté, kožovité, lesklé, prakticky přisedlé, dlouhé (1,2 -) 2 - 5,5cm, široké (0,4 -) 0,8 - 2cm a při mnutí vydávají aromatickou vůni. Kvete samostatnými bílými 5tičetnými květy na dlouhých stopkách o průměru (1,5 -) 2 - 2,5 (i 3)cm. Plodem je kulovitá tmavě modrá až modře fialová bobule průměru (0,5 -) 0,7 - 1 (i 1,2)cm s několika semeny. Nesmí se také zapomenout na její tradiční využití na mašličky svatebčanů. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Compacta' - zakrslý habitus; listy menší
- 'Flore Pleno' - květy plnokvěté
- 'Leucocarpa' - bílé bobule
- 'Microphylla' - listy i květy drobné
- 'Tarentina' - listy drobné a úzké
- 'Variegata' - listy s béžovými okraji

V létě je vhodné rostlinu letnit. Naopak na zimu uklízíme do chladna ideálně kolem 10°C. Není mrazuvzdorná (některé zdroje ale uvádějí odolnost až do -10°C), vhodná teplota pěstování je 15 - 25°C, v zimě 5 - 15°C. Potřebuje bohatou zálivku, nejlépe z dešťové vody, ale zaléváme až v okamžiku proschnutí substrátu. Co se světla týče, ráda si dopřeje plné slunce nebo mírný stín. Přihnojujeme každý týden tekutým hnojivem. Vyhovuje ji lehká písčitá kyseléjší zemina. Nesnáší vápno. Hnojí se 1x za 14 dnů. Přesazování ji příliš neprospívá. Provádíme jej tedy až každý 3 - 4 rok. Mladé exempláře se zaštipují. Je vhodná pro tvorbu bonsají, protože výborně snáší zastřihování.

Množí se semeny nebo vrcholovými řízky s patkou starého dřeva a s dodáváním spodního tepla.