

Lobelia erinus (Lobelka modrá)

synonyma: *Dortmannia debilis* var. *natalensis*, *Dortmannia erinoides*, *Dortmannia erinus*, *Dortmannia erinus* var. *bellidifolia*, *Dortmannia flexuosa*, *Dortmannia lavandulacea*, *Dortmannia senegalensis*, *Enchysia erinoides*, *Grammatotheca erinoides*, *Laurentia erinoides*, *Lobelia acutangula*, *Lobelia algoensis*, *Lobelia altimontis*, *Lobelia bellidifolia*, *Lobelia benguellensis*, *Lobelia bicolor*, *Lobelia bracteolata*, *Lobelia chilawana*, *Lobelia dortmannii*, *Lobelia erinoides*, L. f. *bicolor*, L. f. *elata*, L. var. *bellidifolia*, L. var. *bracteolata*, L. var. *gracilis*, L. var. *grandiflora*, L. var. *schranskii*, L. var. *subvillosa*, *Lobelia filiformis* f. *albiflora*, *Lobelia filiformis* f. *multipilis*, *Lobelia filiformis* f. *muzandazora*, *Lobelia filiformis* var. *filiformis*, *Lobelia filiformis* var. *natalensis*, *Lobelia jugosa*, *Lobelia keilhackii*, *Lobelia lavandulacea*, *Lobelia lydenburgensis*, *Lobelia montaguensis*, *Lobelia natalensis*, *Lobelia natalensis* var. *subulifolia*, *Lobelia nuda*, *Lobelia nuda* f. *hirtella*, *Lobelia nuda* var. *rosulata*, *Lobelia nuzana*, *Lobelia oranjensis*, *Lobelia polyodon*, *Lobelia procumbens*, *Lobelia pubescens* var. *simplex*, *Lobelia raridentata*, *Lobelia rosulata*, *Lobelia rosulata* f. *hirtella*, *Lobelia schrankii*, *Lobelia senegalensis*, *Lobelia senegalensis* var. *senegalensis*, *Lobelia senegalensis* var. *turgida*, *Lobelia transvaalensis*, *Lobelia trierarchii*, *Lobelia turgida*, *Lobelia turgida* var. *peteri*, *Lobelia wildii*, *Lobelia wildii* var. *arcana*, *Monopsis debilis* var. *conspicua*, *Monopsis simplex* var. *conspicua*, *Rapuntium acutangulum*, *Rapuntium bellidifolium*, *Rapuntium bicolor*, *Rapuntium erinoides*, *Rapuntium erinus*, *Rapuntium kohautianum*, *Rapuntium krebsianum*, *Rapuntium procumbens*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Česká republika, Havajské ostrovy, Kalifornie, Kapsko, Michigan, Oregon, Pennsylvania, Utah

Roste v jižní Africe jako vzpřímená jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 20cm a šířky 10 - 15cm. Listy jsou střídavé, vejčité až kopinaté, přizemní jsou zastříhovaně zubaté, krátce řapíkaté a na bázi zúžené. Kvete fialovými drobnými květy, kalich je nálevkovitý, cípy šídlovité, rozestálé, koruna řepicovitě nálevkovitá, modrá (i růžová nebo bílá), až k bázi trubky členěná, horní 2 cípy drobné, kopinaté, dolní 3 vejčité a větší. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Wings'
- 'Blue Cascade' - délka 60cm; květy modré; převislá
- 'California'
- 'Cambridge Blue' - výška 20cm; květy světle modré
- 'Cascade mix' - květy bílé, modré nebo růžově fialové
- 'Color Cascade' - květy modré, fialové, růžové nebo bílé
- 'Crystal Palace' - výška 15cm; listy bronzově hnědé; květy tmavě modře fialové
- 'Emperor William' - květy modré
- 'Kaiser Wilhelm' - výška 10cm; květy modré
- 'Lilac Fountain' - délka 60cm; květy fialové, převislá
- 'Marine' - výška 10cm; květy modré
- var. *pendula* - převislá
- 'Periwinkle'
- 'Regata Midnight'
- 'Riviera Marine'
- 'Riviera Sky Blue'
- 'Rosamund' - výška 10cm, květy červeně růžové s bílým středem
- 'Saphire' - převislý habitus
- 'String of Pearls'
- 'Techno Blue'
- 'Techno Up'
- 'Waterfall'

- 'White Lady' - výška 20cm; květy bílé

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín. Substrát by měl být lehký, bohatý na živiny a udržujte jej stále mírně vlhký. Přihnojíte jednou za 14 dní tekutými hnojivy. Po odkvětu rostlinu důkladně seřízněte.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>