

Codiaeum variegatum (Kroton pestrý)

synonyma: *Codiaeum albicans*, *Codiaeum angustifolium*, *Codiaeum burtonii*, *Codiaeum chelsonii*, *Codiaeum chrysophyllum*, *Codiaeum chrysosticton*, *Codiaeum cooperi*, *Codiaeum crispum*, *Codiaeum cuneifolium*, *Codiaeum dodgonae*, *Codiaeum eburneum*, *Codiaeum elegans*, *Codiaeum elegantissimum*, *Codiaeum elongatum*, *Codiaeum evansianum*, *Codiaeum fucatum*, *Codiaeum goldiei*, *Codiaeum grande*, *Codiaeum hanburyanum*, *Codiaeum henryanum*, *Codiaeum illustre*, *Codiaeum imperiale*, *Codiaeum insigne*, *Codiaeum interruptum*, *Codiaeum jamesii*, *Codiaeum lancifolium*, *Codiaeum lyratum*, *Codiaeum macfarlanei*, *Codiaeum maculatum*, *Codiaeum magnificum*, *Codiaeum majesticum*, *Codiaeum maximum*, *Codiaeum medium*, *Codiaeum moluccanum*, *Codiaeum multicolor*, *Codiaeum mutabile*, *Codiaeum nevilliae*, *Codiaeum obovatum*, *Codiaeum pictum*, *Codiaeum pilgrimii*, *Codiaeum recurvifolium*, *Codiaeum roseopictum*, *Codiaeum spirale*, *Codiaeum stewartii*, *Codiaeum superbiens*, *Codiaeum sylvestre*, *Codiaeum taeniosum*, *Codiaeum timorense*, *Codiaeum trilobum*, *Codiaeum triumphans*, *Codiaeum triumphans var. harwoodianum*, *Codiaeum undulatum*, *Codiaeum vanoosterzeei*, *C. f. ambiguum*, *C. f. angustifolium*, *C. f. appendiculatum*, *C. f. cornutum*, *C. f. crispum*, *C. f. lanceolatum*, *C. f. latifolium*, *C. f. lobatum*, *C. f. longifolium*, *C. f. medium*, *C. f. minus*, *C. f. parvifolium*, *C. f. perringii*, *C. f. platiphyllum*, *C. f. taeniosum*, *C. var. moluccanum*, *C. var. pictum*, *Codiaeum volutum*, *Codiaeum warrenii*, *Codiaeum weismannii*, *Codiaeum williamsii*, *Codiaeum wilsonii*, *Codiaeum youngii*, *Croton aigburtenensis*, *Croton andreas*, *Croton andreeus*, *Croton angustissimus*, *Croton aucubifolius*, *Croton baliospermus*, *Croton bellulus*, *Croton bergmanii*, *Croton carrieri*, *Croton cornutus*, *Croton drouetii*, *Croton duvalii*, *Croton evansianus*, *Croton hastiferus*, *Croton hillianus*, *Croton hookeri*, *Croton imperialis*, *Croton incanus*, *Croton interruptus*, *Croton irregularis*, *Croton johannis*, *Croton lacteus*, *Croton latimaculatus*, *Croton massangeanum*, *Croton mirus*, *Croton multicolor*, *Croton musaicus*, *Croton newmannii*, *Croton philippssii*, *Croton picturatum*, *Croton pictus*, *Croton regelii*, *Croton russelli*, *Croton thomsonii*, *Croton truffautii*, *Croton undulatus*, *Croton variegatus*, *Croton veitchianus*, *Croton vervaetii*, *Croton weismannii*, *Croton wigmannii*, *Crozophyla angustifolia*, *Crozophyla elliptica*, *Crozophyla picta*, *Crozophyla variegata*, *Junghuhnia glabra*, *Oxydectes variegata*, *Phyllaurea codiaeum*, *Phyllaurea variegata*, *Ricinus pictus*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Indie, Indonésie, Malajsie, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Tichý oceán

Roste v Indii, Srí Lance, Indonésii, Malajsii a západních Tichomořských ostrovech v podobě stálezeleného keře. V přírodě dorůstá i 5 (i 6)m výšky, v našich podmínkách max. 3m s průměrem kmene 0,3 - 1cm. Na kmíncích jsou jizvy po odpadlých listech. Listy jsou střídavé, kožovité, lesklé, proměnlivých tvarů (čárkovité, vejčité, eliptické, lopatkovité, celokrajné i laločnaté) a velikostí, dlouhé 5 - 35 (i 40)cm, široké 0,5 - 8 (i 10)cm, barví se do červené, růžové, oranžové nebo žluté, báze je klínovitá, špičatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,5cm. Kvete nenápadnými jednopohlavnými květy v 8 - 25 (i 40)cm zpravidla vzpřímených hroznech, samčí mají barvu bílou, mají 5 kališních lístků, 20 - 30 tyčinek, samčí jsou nažloutlé, kališní lístky vejčité 3úhlé a nemají korunní lístky. Plodem je kulovitá, mírně 3laločná tobolka délky do 1cm a obsahuje 3 semena o velikosti 6mm. Uvnitř jsou 3 hnědá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Americ' - listy zelené, červené, oranžové a žluté s odlišným okrajem
- 'Andreanum' - listy široké
- 'Aucubifolia' - zelený list se žlutooranžovým tečkováním
- 'Aureo-maculatum'
- 'Excelent' - list na vrcholu je "o patro" užší, starší listy jsou v kombinaci červené a zelené, mladé žluté se zelenou
- 'Goldfinger' - páskovaná kombinace žluté se zelenou
- 'Imperiale' - listy žluté s růžovým okrajem, centrální žilka zelená

- 'Interruptum' - listy úzké, žluté se zeleným okrajem, centrální žilka červená
- f. lobatum - listy laločnaté (zpravidla se 3mi tupými nebo špičatými laloky)
- 'Majesticum'
- 'Mrs. Iceton'/'Appleleaf' - list eliptický, mírně zpětně ohnutý, světle červený, oranžový nebo zelený, okraj fialový, střed žlutý
- 'Nervia' - špičatý dlouhý list s širokým středním žebrem ve tvaru rybí kostry, barvy: světle zelená červená a žlutá
- 'Norma' - velký zelenožlutý list
- 'Petric' - list s nepravidelnými skvrnami želené, žluté, oranžové, červené a purpurové
- 'Pictum' - žlutozelený list s puntíkatou kresbou
- var. pictum - pochází z Moluckých ostrovů
- 'Punctatum' - husté olistění, úzký list, žlutozelené tečkování
- 'Rina' - velký eliptický zelený list se žlutými a červenými žilkami
- 'Spirale' - zelené nebo červené listy vyrůstají ve spirále
- 'Warrenii'

Potřebuje co nejvíce světla, ne však přímé. Substrát by měl být propustný, bohatý na živiny. Přezimuje při teplotách 10 - 13°C.

Množí se obalováním kmínku nebo hůře vrcholovými řízky (je potřeba téměř 100% vlhkost a teplota min 30°C).

Codiaeum bractiferum

synonyma: *Codiaeum brevistylum*, *Croton bractifer*, *Croton bractiferus*

Codiaeum ciliatum

Codiaeum finisterrae

Codiaeum ludovicianum

synonyma: *Codiaeum ludovicianum* var. *praeruptorum*, *Codiaeum ludovicianum* var. *rheophyticum*

Codiaeum luzonicum

synonyma: *Codiaeum cuneifolium*, *Codiaeum irosinense*

Codiaeum macgregorii

Codiaeum membranaceum

Codiaeum oligogynum

Codiaeum palawanense

Codiaeum peltatum

synonyma: Chrozophora peltata

Codiaeum stellingianum

Codiaeum trichocalyx

<https://www.rostliny.net/>