

Rhipsalis (Věšák)

čeleď: Cactaceae

Pochází z Ameriky, Afriky a Srí Lanky. Ač se to nezdá, jedná se o primitivní epifytní formu kaktusu. Stonky jsou článkovité, převislé, bez trnů, max. řídce štětinaté. Sbírkou R. naleznete v Liberecké botanické zahradě.

Kvete v období velikonoce. Pěstujte při teplotách 18 - 20°C v létě a na zimu snižte teplotu na 15 - 17°C. Má rád dostatek světla, ovšem bez přímých slunečních paprsků. Substrát by měl zůstat stále vlhký. Dobré je i dopřát rostlině rosení. Po odkvětu zálivku zmírněte a přes zimu ještě více. Pouze dohlédněte, aby substrát nevyschl zcela. Přesazujte po odkvětu do substrátu s kyselějším pH 4,5 - 6. Doporučená skladba zeminy je stejný díl drnovky, listovky, rašeliny a hrubšího písku. Na dno květináče umístěte drenáž.

Rozmnožuje se stonkovými řízků se 2 - 3 částmi a semeny. U řízků postačí, aby se do zeminy vložily pouze nepatrně nebo stačí pouhé opření o okraj květináče a řízek zakoření sám jen díky dotýkající se části se zeminou.

Rhipsalis aculeata

synonyma: *Lepismium aculeatum*, *Lepismium lumbricoides* f. *aculeatum*

Rhipsalis agudoensis

Rhipsalis baccifera (Věšák bobulonosný)

synonyma: *Cactus caripensis*, *Cactus cassythoides*, *Cactus fasciculatus*, *Cactus pendulus*, *Cactus quadrangularis*, *Cassytha baccifera*, *Cassytha filiformis*, *Cassytha polysperma*, *Cereus bacciferus*, *Cereus caripensis*, *Cereus parasiticus*, *Cereus quadrangularis*, *Hariota cassytha*, *Hariota fasciculata*, *Hariota parasitica*, *Hatiora fasciculata*, *R. baccifera* ssp. *fasciculata*, *R. baccifera* ssp. *rhodocarpa*, *R. bartlettii*, *R. bermejensis*, *R. caripensis*, *R. cassutha*, *R. cassuthopsis*, *R. cassytha*, *R. cassytha* var. *rhodocarpa*, *R. cassythoides*, *R. comorensis*, *R. coralloides*, *R. delphinensis*, *R. dichotoma*, *R. fasciculata*, *R. heptagona*, *R. hookeriana*, *R. hylaea*, *R. madagascariensis*, *R. madagascariensis* var. *dasyerca*, *R. mauritiana*, *R. mauritiana* var. *ellipticarpa*, *R. mesembryanthoides*, *R. minutiflora*, *R. neocassutha*, *R. parasitica*, *R. parasiticus*, *R. pendulina*, *R. pilosa*, *R. prismatica*, *R. saxicola*, *R. suarensis*, *R. suareziana*, *R. tetragona*, *R. undulata*

oblasti: Brazílie, Florida, Madagaskar, Portoriko, S Jižní Amerika, Srí Lanka, Střední Asie

Pochází z tropické Ameriky, zavlečen byl ptáky na Madagaskar, Seychely, Mauritus, Reunion a Srí Lanku. Je tak jediným zástupcem čeledi, který roste mimo Ameriku. Patří mezi epifyty i litofyty. Dorůstá délky až 1 - 4m. Převislé výhony jsou tyčkovité, dlouhé 0,5 - 3m o průměru 5mm, bez listů, s tečkovaným povrchem. Žlutavozelenavé květy s 5ti okvětními lístky mají průměr 0,5 - 1cm. Vyrůstají z boků větví. Plodem je bílá nebo narůžovělá bobule velikosti 3 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *baccifera*
- subsp. *erythrocarpa*
- subsp. *hileiabaiana*
- subsp. *horrida*

- subsp. mauritiana
- subsp. shaferi

Rhipsalis bambusoides

synonyma: *Hatiora salicornioides* f. *cylindrica*

Rhipsalis boliviana

synonyma: *Lepismium bolivianum*, *Nothorhipsalis boliviana*, *Pfeiffera boliviana*

Rhipsalis brevispina

Rhipsalis burchellii

synonyma: *Erythrorhipsalis burchellii*, *Erythrorhipsalis cribrata*, *Hariota cribrata*, *R. cribrata*

Rhipsalis campos-portoana

synonyma: *Erythrorhipsalis campos-portoana*

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis carnosum (Věšák masový)

synonyma: *R. carnosa*

Rhipsalis cassutha (Věšák shloučený)

oblasti: Afrika, Jižní Amerika, Srí Lanka, Střední Asie

Pochází z Jižní Ameriky, Afriky a Srí Lanky. Teplota by neměla klesnout pod 10°C.

Rhipsalis cereoides

synonyma: *Lepismium cereoides*

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Rhipsalis cereuscula (Věšák Saglionův)

synonyma: *Erythrorhipsalis cereuscula*, *Hariota cereuscula*, *Hariota penduliflora*, *Hariota saglionis*, *R. penduliflora*, *R. saglionis*

oblasti: Brazílie, Uruguay

Pochází z Uruguaye a Brazílie.

Množí se řízký. Vybíráme ideálně jeden rozvětvený článek, který zasadíme do substrátu obalený ve stimulátoru a mírně zaléváme.

Rhipsalis clavata

synonyma: Erythrorhipsalis clavata, Hariota clavata, Hariota clavata var. deliculata, Hattiora clavata, R. clavata var. deliculata

Rhipsalis crenata

synonyma: Lepismium crenatum

Rhipsalis crispata (Věšák hřebenitý)

synonyma: Cereus crispatus, Cereus crispatus var. crenulatus, Cereus crispatus var. latior, Epiphyllum crispatum, Hariota crispata

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis cruciformis

oblasti: Argentina, Brazílie

Rhipsalis cuneata

Rhipsalis dichotoma

synonyma: R. cassytha var. dichotoma

Rhipsalis dissimilis

synonyma: Lepismium dissimile, R. spinescens

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis elliptica

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie. Články mají plochý eliptický tvar. Kvete červenými květy z boků listů.

Rhipsalis ewaldiana

Rhipsalis floccosa

synonyma: Hariota floccosa, Hattora floccosa, Hylorhipsalis floccosa, Hylorhipsalis floccosa subsp. hohenauensis, Hylorhipsalis floccosa subsp. tucumanensis, Lepismium floccosum, Lepismium tucumanense, R. tucumanensis

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Paraguay, Peru, Venezuela

Roste v Argentíně, Bolívii, Brazílii, Praguayi, Peru a Venezuele. Kvete bílými nebo nažloutlými květy.

Rhipsalis gibberula (Věšák kuličkatý)

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis goebeliana

Rhipsalis grandiflora (Věšák velkokvětý)

synonyma: Lepismium grandiflorum, R. hadrosoma

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis hadrosoma

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis heteroclada

Rhipsalis hoelleri

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Rhipsalis hookeriana

synonyma: R. cassytha var. hookeriana

Rhipsalis horrida

Rhipsalis houletiana (Věšák Houletův)

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis hylaea

Rhipsalis incachacana

synonyma: Lepismium incachacatum

Rhipsalis juengeri

synonyma: Erythrorhipsalis juengeri

Rhipsalis kirbergii

synonyma: R. kirbergii var. monticola

Rhipsalis lindbergiana

synonyma: Hariota lindbergiana

Rhipsalis linearis (Věšák čárkovitý)

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Roste v Argentíně, Brazílii a Paraguayi.

Rhipsalis lingbergiana

Rhipsalis lorentziana

synonyma: Lepismium lorentzianum

Rhipsalis lumbricoides (Věšák žížalovitý)

oblasti: Argentina, Uruguay

Pochází z Argentiny a Uruguaye.

Rhipsalis mesembryanthemoides (Věšák kosmatcovitý)

oblasti: Rio de Janeiro

Pochází z východní Brazílie (Rio de Janeiro).

Rhipsalis micrantha (Věšák drobnokvětý)

synonyma: R. rauhiorum, R. roseana, R. wercklei

oblasti: Ekvádor, Peru, Venezuela

Pochází z Venezuely, Ekvádoru a Peru.

Rhipsalis monacantha

synonyma: Acanthorhipsalis samaipata, Lepismium monacanthum, Pfeiffera monacantha, R. monacantha var. samaipata

Rhipsalis neves-armondii (Věšák velkokvětý)

synonyma: Lepismium megalanthum, R. megalantha, R. neves-armondii f. megalantha

oblasti: JV Brazílie

Pochází z jihovýchodní Brazílie.

Rhipsalis oblonga (Věšák podlouhlý)

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie. Listy mají plochý eliptický tvar s vlnkovaným okrajem.

Rhipsalis occidentalis

Rhipsalis olivifera

Rhipsalis ormindoi

Rhipsalis pacheco-leonis

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Rhipsalis pachyptera (Věšák tlustokřídý)

synonyma: Cactus alatus, Hariota pachyptera

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis paradoxa (Věšák pitvorný)

synonyma: Cereus pterocaulis, Hariota alternata, Hariota paradoxa, Hylorhipsalis paradoxa, Lepismium paradoxum, R. alternata

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis paranganiensis

synonyma: Lepismium paranganiense, Nothorhipsalis paranganiensis

Rhipsalis pentaptera

oblasti: Brazílie, Paraguay

Pochází z Brazílie a Paraguaye. Roste v podobě keřovitého epifytu. Může se vyskytovat ve vzpřímené a převislé formě. Stonek je až 40cm dlouhý, článkovitý s 5 - 6 hranami. Vlastní články dorůstají délky 7- 12cm. Kvete bílými květy. Ploddy mají barvu bílou nebo narůžovělou.

Vyhovuje mu rozptýlené světlo. Minimální teplota pěstování je 10°C.

Rhipsalis pilocarpa

synonyma: Erythrorhipsalis pilocarpa

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie. Roste jako epifytní převislý keřík. Stonky jsou jako u ostatních R. článkovité, mají kruhový průřez o průměru kolem 6mm. Vlastní články dorůstají délky 4cm. Kvete bílými nebo nafialovělými květy. Plody jsou kulaté a mají červenofialovou barvu.

Množí se řízký. Vybíráme ideálně jeden rozvětvený článek, který zasadíme do substrátu obalený ve stimulátoru a mírně zaléváme.

Rhipsalis pittieri (Věšák Pittierův)

oblasti: Venezuela

Pochází z Venezuely.

Rhipsalis platycarpa

synonyma: Epiphyllum platycarpum

Rhipsalis pulchra

synonyma: Erythrorhipsalis pulchra

Rhipsalis puniceodiscus

synonyma: Lepismium puniceo-discus

Rhipsalis ramulosa (Věšák větvičkatý)

oblasti: Bolívie, Peru

Pochází z Peru a Bolívie. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Red Coral'

Rhipsalis rhombea

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis robusta (Věšák mohutný)

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis roseana

oblasti: Kolumbie, Kostarika

Pochází z Kolumbie a Kostariky.

Rhipsalis russellii

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Rhipsalis schaferi

Rhipsalis simmleri

Rhipsalis sulcata

synonyma: Hylorhipsalis sulcata

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie. Stonky mají trojúhelníkový tvar a na hranách se nacházejí nepravidelné řídké pilové hranky.

Rhipsalis teres

synonyma: Cactus teres, Hariota teres, Hatoria teres, R. capilliformis, R. heteroclada

oblasti: Brazílie

Pochází z Brazílie.

Rhipsalis tonduzii

Rhipsalis trigona

synonyma: Hariota trigona, Lepismium trigonum

Rhipsalis tucumanensis

Rhipsalis zanzibarica (Věšák zanzibarský)

oblasti: Zanzibar

Pochází ze Zanzibaru.

Další informace:

<http://www.celysvet.cz/rhipsalis.php>

<http://www.rhipsalis.com/>

<https://www.rostliny.net/>