

## Rhipsalis baccifera (Věšák bobulonosný)

synonyma: Cactus caripensis, Cactus cassythoides, Cactus fasciculatus, Cactus pendulus, Cactus quadrangularis, Cassytha baccifera, Cassytha filiformis, Cassytha polysperma, Cereus bacciferus, Cereus caripensis, Cereus parasiticus, Cereus quadrangularis, Hariota cassytha, Hariota fasciculata, Hariota parasitica, Hatiora fasciculata, R. ssp. fasciculata, R. ssp. rhodocarpa, Rhipsalis bartlettii, Rhipsalis bermejensis, Rhipsalis caripensis, Rhipsalis cassutha, Rhipsalis cassuthopsis, Rhipsalis cassytha, Rhipsalis cassytha var. rhodocarpa, Rhipsalis cassythoides, Rhipsalis comorensis, Rhipsalis coralloides, Rhipsalis delphinensis, Rhipsalis dichotoma, Rhipsalis fasciculata, Rhipsalis heptagona, Rhipsalis hookeriana, Rhipsalis hylaea, Rhipsalis madagascariensis, Rhipsalis madagascariensis var. dasycerca, Rhipsalis mauritiana, Rhipsalis mauritiana var. ellipticarpa, Rhipsalis mesembryanthoides, Rhipsalis minutiflora, Rhipsalis neocassutha, Rhipsalis parasitica, Rhipsalis parasiticus, Rhipsalis pendulina, Rhipsalis pilosa, Rhipsalis prismatica, Rhipsalis saxicola, Rhipsalis suarensis, Rhipsalis suareziana, Rhipsalis tetragona, Rhipsalis undulata

čeled': Cactaceae

oblasti: Brazílie, Florida, Madagaskar, Portoriko, S Jižní Amerika, Srí Lanka, Střední Asie

Pochází z tropické Ameriky, zavlečen byl ptáky na Madagaskar, Seychely, Mauritius, Reunion a Srí Lanku. Je tak jediným zástupcem čeledi, který roste mimo Ameriku. Patří mezi epifyty i litofyty. Dorůstá délky až 1 - 4m. Převyslé výhony jsou tyčkovité, dlouhé 0,5 - 3m o průměru 5mm, bez listů, s tečkovaným povrchem. Žlutavozelenavé květy s 5ti okvětními lístky mají průměr 0,5 - 1cm. Vyrůstají z boků větví. Plodem je bílá nebo narůžovělá bobule velikosti 3 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baccifera
- subsp. erythrocarpa
- subsp. hileiabaiana
- subsp. horrida
- subsp. mauritiana
- subsp. shaferi

<https://www.rostliny.net/>