

# Aeonium arboreum (Eonium stromovitě)

synonyma: A. var. albovariegatum, A. var. luteovariegatum, Aeonium doramae, Aeonium doremae, Aeonium manriqueorum, Sempervivum arboreum, Sempervivum arboreum var. albovariegatum, Sempervivum arboreum var. luteovariegatum

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Kalifornie, Makaronésie, Maroko, Střední střeozemí

Pochází z Kanárských ostrovů. Roste v podobě polokeře až keře. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 2)m. Kmínky jsou víceméně vzpřímené a na povrchu má jizvy po odumřelých listech. Vytváří vzdušné kořeny. Listové růžice mohou být žluté, tmavě červené až téměř černé, mají šířku až 25cm, vlastní listy jsou protaženě obvejčité až obkopinaté, na konci tupé až zakulacené s krátkým hrotem, dlouhé do 6 (i 15)cm, široké 2 (i 4,5)cm, přisedlé a na okraji jemně ochlupené. Květenství je žluté, ochlupené a husté, vlastní květy mají 0,2 - 1,2cm stopky, kališní lístky jsou dlouhé 2 - 3,5mm, kopinaté a korunní lístky jsou dlouhé 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Atropurpureum' - celá rostlina tmavě růzovofialová až nahnědlá
- 'Foliis-purpureis' - tmavěčervené listy
- 'Foliis-variegatis' - žlutobíle pruhované listy
- var. holochrysum/A. vestitum - Tenerife; stopky květů holé
- var. rubrolineatum - Gomera; květy červeně žilkované
- 'Schwarzkopf'/'Zwartkop' - listy úzké, tmavě růzovofialovočerné až černé, lesklé
- 'Variegatum' - béžovo až bíle skvrnité listy

Vhodný substrát vytvoříme z 4 dílu zahradní zeminy, 2 dílů rašeliny a 1 dílu hrubého písku. Přihnojte každých 14 dnů. V letních měsících nenechávejte rostlinu doma, ale dopřejte ji venkovní světlo v mírném závětří s přímým světlem. Zimní teplota by měla být kolem 15°C, ale stále na slunečném místě s omezením zálivky. Roste totiž celý rok.

Rozmnožujeme řízkami s vrcholovými růžicemi. Ty necháme před zasazením 3 dny zaschnout a umístíme na teplé zastíněné místo.

<https://www.rostliny.net/>