

Allamanda cathartica (Allamanda projímavá)

synonyma: Allamanda aubletii, A. f. salicifolia, A. var. grandiflora, A. var. hendersonii, A. var. schottii, A. var. williamsii, Allamanda grandiflora, Allamanda hendersonii, Allamanda latifolia, Allamanda linnaei, Allamanda linnei, Allamanda nobilis, Allamanda salicifolia, Allamanda wardleyana, Allamanda williamsii, Echites salicifolius, Echites verticillatus

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Brazílie, Florida, Francouzská Guyana, Pákistán, Portoriko, Surinam

Roste v Brazílii v podobě stálezelené liány. Pokud má vyhovující podmínky, dokáže rychle nabývat výšky, v místě původu až 15m. Když bude mít omezený přísun živin a prostoru jak je tomu v pokojovém květináči, zůstává ve velikosti malého keříku. Listy vyrůstají v 4četných přeslenech nebo vstřícně, jsou obvejčité až obkopinaté, špičaté, lesklé, kožovité, tuhé, dlouhé (5 -) 6 - 10 (i 16)cm, široké (2 -) 3 - 4 (i 6)cm a řapík má délku 5mm. Kvete vrcholovými žlutými nálevkovými květy délky 8 - 12cm, průměru 8 - 15cm s doširoka rozprostřeným vrcholem s 5ti vejčitě kopinatými cípy délky 3,5cm a šířky 4cm. Plodem je kulatá nebo vejčitá zploštělá tobolka šířky 4 - 8cm opatřená měkkými ostny délky 7,5mm s mnoha plochými okřídlenými semeny šířky 2cm. Při poranění roní bílý jedovatý latex. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Double' - z části plnokvětá
- var. grandiflora
- var. hendersonii/'Hendersonii' - méně vzrůstná; květy žluté s bíle skvrnitým ústím
- var. nobilis
- f. salicifolia
- var. schottii
- var. williamsii

Potřebuje přímé sluneční světlo, střední zálivku po oschnutí substrátu, teplo 18 - 20°C a vyšší vzdušná vlhkost. Hnojení stačí jednou za 14 dní. Substrát by měl být lehký a dobře vydrénážený. Zimuje za teploty 15 - 18°C. Dobře snáší řez.

Množí se vrcholovými stonkovými řízkami nebo listovými řízkami.

<https://www.rostliny.net/>