

Echinocereus coccineus

synonyma: *Cereus aggregatus*, *Cereus coccineus* var. *cylindricus*, *Cereus coccineus* var. *melanacanthus*, *Cereus conoideus*, *Cereus hexaedrus*, *Cereus neomexicanus*, *Cereus paucispinus*, *Cereus phoeniceus*, *Cereus roemerii*, *Echinocereus arizonicus*, *Echinocereus arizonicus* subsp. *matudae*, *Echinocereus arizonicus* subsp. *nigrihorridispinus*, *Echinocereus canyonensis*, *E.* subsp. *aggregatus*, *E.* subsp. *roemerii*, *E.* subsp. *rosei*, *E.* subsp. *transpecosensis*, *E.* var. *arizonicus*, *E.* var. *inermis*, *E.* var. *kunzei*, *E.* var. *paucispinus*, *Echinocereus conoideus*, *Echinocereus conoideus* var. *cristata*, *Echinocereus decumbens*, *Echinocereus engelmannii* subsp. *decumbens*, *Echinocereus engelmannii* var. *decumbens*, *Echinocereus hexaedrus*, *Echinocereus krausei*, *Echinocereus kunzei*, *Echinocereus matudae*, *Echinocereus melanacanthus*, *Echinocereus monacanthus*, *Echinocereus paucispinus*, *Echinocereus phoeniceus*, *Echinocereus phoeniceus* var. *conoideus*, *Echinocereus phoeniceus* var. *inermis*, *Echinocereus polyacanthus* var. *neomexicanus*, *Echinocereus roemerii*, *Echinocereus toroweapensis*, *Echinocereus triglochidiatus* f. *inermis*, *Echinocereus triglochidiatus* subsp. *coccineus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *arizonicus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *coccineus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *inermis*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *melanacanthus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *neomexicanus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *paucispinus*, *Echinocereus triglochidiatus* var. *toroweapensis*, *Echinocereus* x *neomexicanus*, *Mammillaria aggregata*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *arizonicus*
- subsp. *coccineus*
- var. *neomexicanus* - průměru 7cm, kvete červenými květy, za naprostého sucha odolává do -10°C
- var. *paucispinus*
- subsp. *rosei*

<https://www.rostliny.net/>