

Euonymus attenuatus

čeleď: Celastraceae

oblasti: Bangladéš, Bengálsko, Čína, Himálaj, Kambodža, Malajsie, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste v Indii, Číně, Bangladéši, Kambodži, Himálaji, Malajsii, Myanmaru a Thajsku v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3 (i 15)m. Větve jsou v mládí mírně brázdité, tmavěhnědé až růžovofialovohnědé. Listy jsou eliptické až mírně kopinaté, špičaté až zašpičaté, mohou být mírně kožovité, na vrcholku drobně zubaté nebo vroubkované, dlouhé 7 - 14cm, široké 3 - 5cm, báze klínovitá nebo protáhlá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenstvím je větvený 7 - 15tikvětý vrcholík délky 5 - 6cm, má až 2,5cm stopku, listeny vejčité, krátce ochlupené, vlastní květy mají 2 - 3,5mm stopku, kališní lístky jsou 4četné, kulaté, velikosti 0,8 - 1,5mm, vnější 2 bývají menší, korunní lístky jsou béžové až světležluté, prakticky kulaté nebo široce obvejčité, velikosti 3 - 4mm a terč má v průměru 1,5mm. Plodem je obvejčité nebo mírně zploštěle kulovité ostře 5tíhranná tobolka délky 1,2cm, šířky 1,7cm a obsahuje eliptická semena.

<https://www.rostliny.net/>