

Euonymus benquetensis

čeleď: Celastraceae

oblasti: Filipíny, Sumatra

Roste na Sumatře a Filipínách v podobě šplhavého nebo poléhavého keře. Větve jsou bledězelené a v mládí mohou být mírně hranaté, zpravidla bradavčité. Listy jsou vejčité až eliptické (i obvejčité), špičaté (i tupé), drobně pilovité nebo vroubkované, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 1,5 - 4cm, báze je špičatá nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je úžlabní (i mimoúžlabní), 3 - 10tkvěté, dlouhé 2 - 4,5cm, má 1 - 3,5cm stopku, listeny jsou 3úhlé až kopinaté, dlouhé 3 - 8mm, listence na bázi stopek květů 3úhlé, vytrvávající, vlastní květy jsou zelenobílé nebo nažloutlé, 4četné, mají 7 - 9mm stopku, kališní laloky 1/2kulaté až 3úhlé, na okraji hnědočervené, zoubkované, dlouhé 1 - 2mm, korunní lístky obvejčité, dlouhé 4 - 4,5mm, široké 2 - 3mm, občas podvinuté, terč mírně 4hranný a průměru 2 - 3mm. Plodem je kulovitá hustě ostnitá tobolka velikosti do 1,3cm (včetně ostnů).

<https://www.rostliny.net/>