

Euonymus maackii

synonyma: Euonymus bungeanus, Euonymus bungeanus f. pendulus, Euonymus bungeanus var. integrifolius, Euonymus bungeanus var. latifolius, Euonymus bungeanus var. mongolicus, Euonymus bungeanus var. ovatus, Euonymus bungeanus var. semipersistens, Euonymus coreanus, Euonymus forbesii, Euonymus hamiltonianus var. maackii, Euonymus hamiltonianus var. semipersistens, E. f. lanceolatus, E. f. salicifolius, E. var. trichophyllus, Euonymus micranthus, Euonymus mongolicus, Euonymus oukiakensis, Euonymus quelpaertensis, Euonymus semipersistens, Euonymus trapococcus

čeleď: Celastraceae

oblasti: Altaj, Čína, Japonsko, Kazachstán, Korea

Roste v Číně, Japonsku, Koreji a Rusku v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m při průměru kmene 15cm. Větve jsou zelené až bledězelené. Listy jsou široce vejčité, eliptické nebo vejčitěkopinaté, špičaté (i ocasovité), vroubkované, mohou být mírně kožovité, dlouhé 6 - 10,5cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství je větvené, několikakvěté, má 2 - 3,5cm stopku, vlastní květy jsou 4četné, mají 5 - 7mm stopku, kališní lístky vejčité, korunní lístky jsou kopinaté až úzce vejčité, bílé a průměru 8 - 9mm. Plodem je kosočtvercovitá hnědá nebo žlutohnědá až červenohnědá tobolka průměru 9mm a obsahuje prakticky kulatá tmavěhnědá semena s oranžovým míškem.

<https://www.rostliny.net/>