

Euonymus nitidus (Brslen lesklý)

synonyma: *Euonymus chengiae*, *Euonymus chibai*, *Euonymus chinensis*, *Euonymus chinensis* var. *nitidus*, *Euonymus esquirolii*, *Euonymus flavescens*, *Euonymus lindleyi*, *Euonymus merrilli* var. *longipetiolatus*, *Euonymus merrillii*, *Euonymus merrillii* var. *longipetiolatus*, *Euonymus nantoensis*, *Euonymus oblongifolius*, *Euonymus punctatus*, *Euonymus uniflorus*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Bangladéš, Čína, Japonsko, Kambodža, Vietnam

Roste v Číně, Bangladéši, Kambodži, Japonsku a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10cm. Větve jsou šedočerné nebo šedohnědé, v mládí nazelenalé nebo žlutozelené a pruhované. Listy jsou eliptické, špičaté, mohou být vroubkované, dlouhé 6,5 - 15cm, široké 3 - 6cm, báze klínovitá nebo zašpičatělá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenství je větvené, bohatě květnaté, má 1,5 - 3,5cm stopku, vlastní květy jsou 4četné, mají 0,4 - 1cm stopku, kališní lístky zelenobílé, kulaté až obvejčité a průměru 5 - 6mm. Plodem ne narůžovělá nebo načervenalá, později hnědá, žlutohnědá nebo hnědočervená tobolka průměru 1,2 - 1,6cm a obsahuje vejčité tmavěhnědá semena s oranžovým míškem.

<https://www.rostliny.net/>