

# Euonymus viburnoides

synonyma: *Euonymus chenkangensis*, *Euonymus crenatus*, *Euonymus forrestii*, *Euonymus saxicola*

čeleď: Celastraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Myanmar (Barma), Sikkim

Roste v Číně, Bhútánu, Indii a Myanmaru v podobě stálezeleného epifytického zpravidla převislého (i popínavého) keře (i stromu). Větve jsou v mládí šedozelené až šedohnědé. Listy jsou vejčité, zašpičatělé až tupé, pilovité až vroubkované, mírně kožovité, dlouhé 5 - 11cm, široké 2 - 4cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1,3cm. Květenstvím je řídký vrcholík na 4 - 9cm stopce, vlastní květy jsou 4četné, průměru 6 - 7mm, kališní cípy mají velikost 1,5mm, korunní lístky jsou červené až hnědočervené, kulaté a velikosti 2,5 - 3mm. Plodem je eliptická až obkruželovitá mírně 4hranná tobolka délky 1cm, šířky 1,2cm a obsahuje eliptická tmavěhnědá semena s oranžovým míškem.

<https://www.rostliny.net/>