

Cotoneaster qungbixiensis

čeleď: Rosaceae

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě opadavého nebo polostálezeleného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou vzpřímené, obloukovité, červenohnědé, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích úzce vejčité nebo úzce eliptické, na konci špičatě uťaté nebo špičaté, báze je klínovitá nebo tupá, horní strana mírně svrasklá, tmavězelená, lesklá, v mládí ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, spodní strana je šedě plsnatá, řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm, bývají červené, celková délka je 2,8 - 4,2cm a šířka 1,3 - 2,1cm. Květenství je kompaktní, 3 - 15tičetné. Květy mají 1 - 3mm stopky, včetně češule délku 7 - 8mm, češule je nálevkovitá, hedvábně plstnatá, kališní lístky špičaté, plstnaté, koruna je otevřená, okvětní lístky růžové s tmavěčervenou bází a nažloutlým a špinavě bílým okrajem. Plody jsou kulovité nebo obvejčité, oranžovočervené, mírně lesklé, ochlupené, ve velikost 0,8 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>