

Honckenya peploides (Kuřinečka pryšcovitá)

synonyma: *Alsine peploides*, *Ammodenia peploies*, *Arenaria diffusa*, *Arenaria littoralis*, *Arenaria peploides*, *Arenaria portulacea*, *Arenaria sitchensis*, *Cerastium succulentum*, *Halianthus peploides*, *Honckenya diffusa*, *Honckenya frigida*, *H. subsp. diffusa*, *H. var. diffusa*, *Minuartia peploides*

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Aljaška, Belgie, Britská Kolumbie, Connecticut, Dánsko, Delaware, Estonsko, Francie, Grónsko, Irsko, Island, Japonsko, Kamčatka, Korea, Labrador, Litva, Lotyšsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rhode Island, Sachalin, Severozápadní Teritorium, SV Evropa, Španělsko, Špicberky, Velká Británie, Virginie, Washington, Yukon

Roste kolem celého severního polárního kruhu. Patří mezi trvalky a sukulentní kobercově rostoucí rostliny. Kořeny jsou bohaté a dorůstají hloubky až 2m. Dorůstá výšky 2 - 8 (i 30)cm. Stonek je poléhavý, holý, při bázi rozvětvený a oslitěný. Listy jsou eliptické až vejčité se špičkou, lesklé, drsné, holé, mají délku 0,4 - 2 (i 3)cm a šířku 0,3 - 0,9 (i 1,3)cm. Kvete drobnými zelenobílými samostatnými květy nebo v chudých soukvětích. Má 5 (i 6) kališních lístků délky 3,5 - 6mm v barvě zelené až fialové, vlastní koruna má průměr 0,5 - 1,5cm. Plodem je kulovitá až vejčitá tobolka se 3mi chlopněmi délky 0,5 - 0,8 (i 1)cm a šířky 5 - 8mm. Obsahuje mnoho semen.

Roste na mořském pobřeží ve vlhkém písčku i kameních nebo v zasolených půdách s nízkým obsahem živin.

<https://www.rostliny.net/>