

Hypochaeris (Prasetník)

synonyma: Hypochoeris

čeleď: Asteraceae

Jedná se o trvalky nebo jednoleté byliny pocházející především z Jižní Ameriky, některé z Euroasie a severní Afriky. Kvete v úborech žlutými květy. Plodem je nažka.

Hypochaeris achyrophorus

synonyma: *H. aethnensis*, *Seriola aethnensis*, *Seriola aethnensis* var. *hispida*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výška 14 - 40 (i 55)cm. Povrch je ochlupený. Květenstvím je úbor se zákrovem délky 1 - 1,3cm. Plodem je nažka délky 4 - 5mm.

Hypochaeris alba

Hypochaeris albiflora

Hypochaeris angustifolia

synonyma: *H. laevigata* subsp. *angustifolia*, *H. laevigata* var. *platyphylla*

Hypochaeris apargioides

synonyma: *Achyrophorus apargioides*, *H. berteri*

Hypochaeris arachnoidea

synonyma: *Achyrophorus minimus*, *H. arachnoides*, *H. glabra* subsp. *arachnoides*, *H. grandiflora*, *H. minima*, *H. multicaulis*, *H. radicata* var. *setulosa*

Hypochaeris arachnoides

Hypochaeris arenaria

synonyma: *Achyrophorus andinus*, *Achyrophorus arenarius*, *Achyrophorus humilis*, *Achyrophorus psychrophilus*, *H. andina*, *H. arenaria* var. *andina*, *H. humilis*, *H. psychrophila*, *H. pygmaea*, *H. ushuaiae*, *Leontodon arenarius*

Hypochaeris argentina

oblasti: Argentina

Hypochaeris atlantica

Hypochaeris barbata

synonyma: *Achyrophorus barbatus*, *Achyrophorus sessiliflorus* var. *barbatus*

Hypochaeris brasiliensis

oblasti: Alabama, Brazílie, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas

Hypochaeris caespitosa

Hypochaeris catharinensis

Hypochaeris chillensis

synonyma: *Achyrophorus brasiliensis*, *Achyrophorus sagittatus*, *Achyrophorus selloi*, *Apargia chillensis*, *H. brasiliensis* var. *chacoensis*, *H. brasiliensis* var. *sulfurea*, *H. tweediei*, *Seriola tweediei*

oblasti: Čile

Hypochaeris chondrilloides

synonyma: *Achyrophorus chondrilloides*, *Achyrophorus deserticola*, *Achyrophorus glaucus*, *H. glauca* f. *halophila*, *H. halophila*, *Oreophila chondrilloides*

Hypochaeris chubutensis

Hypochaeris ciliata

synonyma: *Achyrophorus aurantiacus*, *Achyrophorus ciliatus*, *Achyrophorus grandiflorus*, *Amblachaenium aurantiacum*, *Arnica ciliata*, *H. grandiflora*

Hypochaeris clarionoides

synonyma: *Achyrophorus clarionoides*, *Achyrophorus microphyllus*, *H. clarionoides* var. *microphylla*, *H. microphylla*, *H. nana*, *H. tenuifolia* var. *clarionoides*

Hypochaeris claryi

Hypochaeris confusa

Hypochaeris crepidioides

synonyma: *Picris crepioides*

Hypochaeris cretensis

synonyma: Achyrophorus ambiguus, Achyrophorus hispidus, Achyrophorus oxydontus, Achyrophorus pinnatifidus, Achyrophorus seriolooides, Baldingeria urens, Fabera cretensis, Fabera hispida, H. cretensis subsp. pinnatifida, H. hispida, H. pinnatifida, H. sardoa, H. sicula, Metabasis cretensis, Metabasis neapolitana, Seriola cretensis

oblasti: Itálie, Kréta

Hypochaeris cryptocephala

synonyma: Achyrophorus cryptocephalus

Hypochaeris cupressorum

Hypochaeris deserticola

Hypochaeris dolosa

Hypochaeris dubia

Hypochaeris echeagarayi

synonyma: H. meyeniana var. leucantha, H. ornata

Hypochaeris elata

synonyma: Achyrophorus elatus

Hypochaeris erecta

Hypochaeris eremophila

synonyma: Distoecha taraxacoides

Hypochaeris eriolaena

synonyma: Achyrophorus eriolaenus

Hypochaeris foliosa

synonyma: Achyrophorus foliosus

Hypochaeris gayana

synonyma: *Achyrophorus tenuifolius* var. *gayanus*, *H. philippii* var. *glabrescens*, *H. tenerifolia* var. *glabrescens*

Hypochaeris glabra (Prasetník lysý)

synonyma: *Achyrophorus balbisii*, *Crepis molokaiensis*, *Cycnosseris australis*, *Hyoseris tenella*, *H. balbisii*, *H. capensis*, *H. glabra* subsp. *minima*, *H. glabra* var. *erostris*, *H. glabra* var. *hispidula*, *H. glabra* var. *loiseleuriana*, *H. minima*, *H. pumila*, *H. radicata* subsp. *glabra*, *H. simplex*, *Hypochaeris glabra*

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Asie, Austrálie, Britská Kolumbie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Maine, Massachusetts, Mississippi, Německo, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, S Afrika, Severní Karolína, Švýcarsko, Texas, Washington, Západní Virginie

Pochází z Evropy, Asie a severní Afriky a rozšířil se i jinde. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (4 -) 20 - 30 (i 45)cm. Vytváří jeden nebo více stonku a přízemní růžici listů. Listy jsou přízemní, mají délku 2 - 10cm, barvu zelenou, někdy načervenalou a po okrajích jsou mělce laločnaté. Kvete sytě žlutými květy v úboru, zákrov má délku 1,5 - 2cm, okrajové květy mají stejnou délku jako zákrovní listeny. Plodem je nažka délky 0,8 - 1,1cm s chmýrem délky 0,8 - 1,2cm, vnější jsou utaté, vnitřní s dlouhým zobánkem. Dnes je u nás neznámý.

Vyhovují mu písčiny a narašená místa.

Hypochaeris glabrata

Hypochaeris graminea

Hypochaeris grandidentata

synonyma: *Achyrophorus grandidentatus*

Hypochaeris grandiflora

Hypochaeris grandiflorus

synonyma: *Doronicum ciliatum*

Hypochaeris grisebachii

Hypochaeris helvetica

synonyma: *Achyrophorus helveticus*

oblasti: Rakousko

Hypochaeris hirta

Hypochaeris hispidula

Hypochaeris hohenackeri

synonyma: Achyrophorus hohenackeri

Hypochaeris jussieui

synonyma: Achyrophorus jussieui

Hypochaeris laciniosa

Hypochaeris laevigata

synonyma: H. albicans, H. alliatae, H. glauca, Seriola alliatae, Seriola hieracioides, Seriola laevigata

oblasti: Itálie

Hypochaeris leontodontoides

synonyma: H. laevigata subsp. leontodontoides, H. leontodontoides var. atlantica, H. leontodontoides var. villosa

Hypochaeris lessingii

synonyma: Achyrophorus lessingii

Hypochaeris linearifolia

Hypochaeris lutea

synonyma: Achyrophorus bipontinae, Achyrophorus gardneri, Achyrophorus trichocephalus, H. gardneri, H. lutea var. trichocephala, Prenanthes lutea

Hypochaeris maculata (Prasetník plamatý)

synonyma: Achyrophorus alpicolus, Achyrophorus maculatus, H. carpathica, Hypochaeris maculata, Trommsdorffia maculata, Trommsdorffia maculata

oblasti: Altaj, Česká republika, Francie, Itálie, Katalánsko, Kazachstán, Německo, Polsko, Sajany, Skandinávie, Švýcarsko, Ural, Z Mongolsko

Roste v Euroasii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (25 -) 30 - 40 (i 70)cm. Lodyha je přímá, většinou s 1 - 2mi větvemi, je řídce štětinatá a pod květenstvím mírně ztlustlá. Listy vytvářejí přizemní růžici, mají tvar obvejčitý až eliptický, okraje celokrajné až peřenoklané, na horní straně bývají tmavé skvrny. Lodyžní listy jsou malé, kopinaté. Kvete žlutými květy v úboru o průměru 1,3 - 2cm, zákrovní listeny tmavé se světlým plstnatým okrajem, jsou světle ochlupené s řídkými tmavými štětinami. Plodem je nažka s chmýrem. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují mu sušší trávníky, okraje lesů, ideálně s vápencovým podkladem a teplo.

Hypochaeris magellanica

Hypochaeris megapotamica

Hypochaeris melanolepis

Hypochaeris microcephala

synonyma: Achyrophorus microcephalus, H. brasiliensis var. microcephala, Seriola brasiliensis var. parviflora

oblasti: Georgia, Louisiana, Texas

Hypochaeris montana

Hypochaeris mucida

Hypochaeris nahuelbutae

Hypochaeris nahuelvutae

Hypochaeris neopinnatifida

synonyma: H. pinnatifida, H. rosengurtii var. pinnatifida

Hypochaeris oligocephala

synonyma: Heywoodiella oligocephala

oblasti: Makaronésie

Pochází z Kanárských ostrovů.

Hypochaeris palustris

Hypochaeris pampasica

Hypochaeris parodii

Hypochaeris parvifolia

Hypochaeris patagonica

oblasti: Patagonie

Hypochaeris petiolaris

synonyma: Achyrophorus petiolaris, Seriola petiolaris

Hypochaeris pilosa

synonyma: H. hirta

Hypochaeris procumbens

Hypochaeris radiata

Hypochaeris radicata (Prasetník kořenatý)

synonyma: Hypochaeris radicata

oblasti: Alabama, Aljaška, Andalusie, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čile, Delaware, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, J Brazílie, Japonsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Kréta, Labrador, Louisiana, Maine, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Patagonie, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, S Afrika, Saskatchewan, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Uruguay, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Evropy, ale byl introdukován do Severní i Jižní Ameriky, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří dlouhý vřetenovitý kořen. Dorůstá výšky (15 -) 40 - 70 (i 80)cm. Lodyha je přímá nebo záhy vystoupavá a větví se v horní 1/2. Listy vytvářejí přízemní růžici, mají dlouze obkopinatý tvar, okraje jsou laločnaté až peřenolaločnaté či peřenoklanné, povrch štětinatě ochlupený, délka dosahuje 6 - 15cm, šířka 1,5 - 3cm. Kvete sytě žlutými květy v úboru o průměru 2 - 3cm, zákrov má délku 1,7 - 3,2cm, okrajové květy jsou delší než zákrovní listeny. Plodem je nažka délky 1,4 - 1,9cm s dlouhým zobánkem a chmýrem délky 1 - 1,4cm. Při poranění roní bílé mléko.

Vyskytuje se na loukách, pastvinách, okrajích cest, suchých okrajích lesů, náspech, atp. v hlinitopísčité až písčité, neutrální nebo kyselé půdě.

Hypochaeris robertia

synonyma: Achyrophorus robertia, H. taraxacoides, Robertia taraxacoides, Seriola taraxacoides, Seriola uniflora

oblasti: Itálie, Korsika, S Afrika, Sardínie, Sicílie

Roste na Korsice, Sardínii, Sicílii, severní Africe a Itálii žlutými květy o velikosti kolem 2cm.

Vyhovuje mu kamenitá suťová půda a plné slunce.

Hypochaeris rutea

Hypochaeris saldensis

Hypochaeris salzmanniana

synonyma: *H. glabra* subsp. *salzmanniana*, *H. glabra* var. *arrhyncha*, *H. glabra* var. *dimorpha*, *H. glabra* var. *salzmanniana*

Hypochaeris schizoglossa

Hypochaeris scorzonerae

synonyma: *Achyrophorus chrysanthus*, *Achyrophorus gayii*, *Achyrophorus scorzonerae* var. *glabratus*, *Achyrophorus scorzonerae* var. *ramosus*, *Seriola taraxacoides*

Hypochaeris sellowii

synonyma: *Achyrophorus sellowii*

Hypochaeris seriolooides

Hypochaeris sessiliflora (Prasetník bezestvolný)

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, S Andy, Venezuela

Roste v oblasti párama v Kolumbii, Ekvádoru, Peru, Venezuely a Bolívie. Kvete žlutými květy.

Hypochaeris setosa

Hypochaeris shermanum

Hypochaeris sichorioides

Hypochaeris sonchoides

synonyma: *Achyrophorus quitensis* var. *sonchoides*, *Achyrophorus sonchoides*

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Hypochaeris soratensis

Hypochaeris spathulata

synonyma: Achyrophorus spathulatus var. chiloensis

Hypochaeris stuebelii

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Hypochaeris taraxacoides

synonyma: H. stenocephala var. integrifolia, H. stenocephala var. taraxacoides, Oreophila taraxacifolia

Hypochaeris tenuiflora

synonyma: Robertia tenuiflora

oblasti: Alpy, Česká republika, Jižní Amerika, Karpaty, Kréta

Roste v horách Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 50cm. Lodyha je nevětvená, zakončená žlutým květem v úboru o průměru 4 - 6cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou čárkovité, obkopynaté nebo lžičkovité, peřenolaločné a dlouhé 1,5 - 10cm. Květenstvím je úbor o průměru 5 - 9mm, zákrovní listy jsou dlouhé do 1cm, široké 2mm, okvětní lístky jsou žluté. Plodem je nažka délky 4,5 - 6,5mm s jednořadým chmýrem. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují mu horské louky a pastviny.

Hypochaeris tenuifolia

synonyma: Achyrophorus araucanus, Achyrophorus odoratus, Achyrophorus tenuifolius var. linearifolius, Achyrophorus tenuifolius var. neaeanus, H. eurylepis, H. graminifolia, H. odorata, H. odorata var. eurylepis, Oreophila odorata

oblasti: Střední Čile

Hypochaeris thermanum

Hypochaeris thrincioides

synonyma: Achyrophorus philippii

Hypochaeris toltensis

synonyma: *H. grandiflora*

Hypochaeris tropicalis

Hypochaeris uniflora (Prasetník jednoúborný)

synonyma: *Achyrophorus helveticus*, *Achyrophorus uniflorus*, *H. uniflora* subsp. *facchiniana*, *Hypochaeris facchiniana*, *Hypochaeris uniflora*, *Trommsdorffia uniflora*, *Trommsdorffia uniflora*

oblasti: Alpy, Česká republika, Itálie, Karpaty, Německo, Polsko, Švýcarsko

Roste v Alpách, Karpatech a Sudetech jako trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 50 (i 60)cm. Lodyha je nevětvená, v horní 1/2 ztlustlá a nese 1 úbor. Listy vytvářejí přízemní růžici. Kvete žlutými květy v úboru o průměru 4 - 6cm, zákrovní listy jsou tmavé, ochlupené, tmavé, bez světlého plstnatého okraje. Plodem je nažka s jednořadým chmýrem. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *pallidiflora* (Prasetník jednoúborný bledý) - Krkonoše

Vyhovují mu horské louky a pastviny.

Hypochaeris variegata

synonyma: *Achyrophorus tenuisectus*, *Achyrophorus variegatus*, *Apargia variegata*, *Hieracium variegatum*, *H. philippii*, *Leontodon variegatum*

Hypochaeris volckmannii

Hypochaeris webbii

synonyma: *Achyrophorus praemorsus*

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hypochaeris-maculata/>

<https://www.rostliny.net/>