

## Hypochaeris glabra (Prasetník lysý)

synonyma: *Achyrophorus balbisii*, *Crepis molokaiensis*, *Cycnoseris australis*, *Hyoseris tenella*, *Hypochaeris balbisii*, *Hypochaeris capensis*, *H. subsp. minima*, *H. var. erostris*, *H. var. hispidula*, *H. var. loiseleuriana*, *Hypochaeris minima*, *Hypochaeris pumila*, *Hypochaeris radicata subsp. glabra*, *Hypochaeris simplex*, *Hypochoeris glabra*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Andalusie, Arkansas, Asie, Austrálie, Britská Kolumbie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Maine, Massachusetts, Mississippi, Německo, New York, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, S Afrika, Severní Karolína, Švýcarsko, Texas, Washington, Západní Virginie

Pochází z Evropy, Asie a severní Afriky a rozšířil se i jinde. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (4 -) 20 - 30 (i 45)cm. Vytváří jeden nebo více stonku a přizemní růžici listů. Listy jsou přizemní, mají délku 2 - 10cm, barvu zelenou, někdy načervenalou a po okrajích jsou mělce laločnaté. Kvete sytě žlutými květy v úboru, zákrov má délku 1,5 - 2cm, okrajové květy mají stejnou délku jako zákrovní listy. Plodem je nažka délky 0,8 - 1,1cm s chmýrem délky 0,8 - 1,2cm, vnější jsou uťaté, vnitřní s dlouhým zobánkem. Dnes je u nás nezvěstný.

Vyhovují mu písčiny a narašená místa.

<https://www.rostliny.net/>