

Comptonia peregrina (Postopčák cizí)

synonyma: *Comptonia asplenifolia*, *Comptonia aspleniifolia*, *Comptonia ceterach*, *C. var. asplenifolia*, *C. var. aspleniifolia*, *C. var. tomentosa*, *Liquidambar asplenifolia*, *Liquidambar peregrina*, *Myrica aspleniifolia*, *Myrica aspleniifolia var. tomentosa*, *Myrica comptonia*, *Myrica peregrina*

čeleď: Myricaceae

oblasti: Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě opadavého hustě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 1,5)m a šířky 1 - 1,5m. Větve jsou hnědočervené, štětinatě ochlupené, v mládí hustě červenohnědě ochlupené a křehké. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, žlutě tečkované, dlouhé 5 - 12 (i 15,5)cm, z obou stran má 10 - 16 zakulacených laloků a při mnutí aromatické. Kvete jednopohlavnými nevýraznými květy v jehnědách, samčí květy jsou červenohnědé, mají (3 -) 4 (i 8) tyčinek a délku 3,5 - 5cm, samičí jsou hnědé, kulovité, zkrácené a průměru 0,5 - 2,5cm. Plodem je malý šídlovitě ostnitý oříšek délky 2,5 - 5,5mm v asi 2cm širokém souplodí. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *asplenifolia* - větvičky jemně ochlupené; listy menší; souplodí prakticky holé

Vyhovují mu suché borové lesy, skaliska a jiné chudé půdy s kyselým pH, vlhkou půdou a polostín. Rychle se rozrůstá.

Množí se semeny, kořenovými výmladky a řízký nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>