

Gymnocalycium

čeleď: Cactaceae

Roste v Jižní Americe, především v Argentině, Uruguayi, Paraguayi, jižní Bolívii a Brazílii v podobě nízkého kulovitého až válcovitého kaktusu. Dorůstá zpravidla výšky 4 - 15cm. Tělo má přímé nebo spirálovité žebra, mohou se až rozpadat do hrbolků a trny jsou mírně zahnuté. Kvete nálevkovitými květy. Nejznámějším druhem je *G. baldianum*.

Má rád dostatek světla (paradoxně by neměl ale přijít na přímé polední). Patří mezi méně náchylné kaktusy na přelití, ale přesto zalévejte pouze málo. Na zimu rostliny přemístěte do chladné místnosti o teplotě 5 - 10°C a zcela zastavte zálivku. Substrát potřebuje dobře propustný, písčité, s výbornou drenáží. Hnoj se 1 - 2x měsíčně speciálními hnojivy pro kaktusy.

Množí se odnožemi nebo semeny.

Gymnocalycium accorugatum

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny. Těle dorůstá výšky 4,5cm a průměru až 7,5cm.

Gymnocalycium achirasense

Gymnocalycium acorrugatum

Gymnocalycium albiareolatum

Gymnocalycium albispinum

Gymnocalycium alboareolatum

synonyma: *G. alboareolatum* var. *ramosum*

Gymnocalycium altagraciense

Gymnocalycium ambatoense

Gymnocalycium amerhauseri

synonyma: *G. amerhauseri* subsp. *altagraciense*

Gymnocalycium andreae

synonyma: *Echinocactus andreae*, *G. andreae* f. *svecianum*, *G. andreae* subsp. *matznetteri*, *G.*

andreae var. fechseri, G. andreae var. grandiflorum, G. andreae var. longispinum

oblasti: Argentina

Roste v Argentině. Dorůstá výšky 5cm a šířky 10cm. Tělo je lesklé, modrozelené, kulovité, s 8mi žebry, z areol vyrůstá 7 žlutých trnů, 3 středové jsou zahnuté vzhůru. Kvete žlutými nálevkovitými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. andreae
- subsp. carolinense
- subsp. matznetteri
- subsp. fechseri
- subsp. longispinum

Gymnocalycium angelae

Gymnocalycium anisitsii

synonyma: Echinocactus anisitsii, Echinocactus joossensianus, G. anisitsii subsp. volkeri, G. anisitsii var. griseopallidum, G. anisitsii var. pseudomalacocarpus, G. anisitsii var. tucavocense, G. damsii, G. griseopallidum, G. joossensianum

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. anisitsii
- subsp. multiproliferum

Gymnocalycium baldianum

synonyma: Echinocactus baldianus, Echinocactus sanguiniflorus, G. baldianum var. albiflorum, G. platense var. baldianum, G. sanguiniflorum, G. venturianum

oblasti: Argentina

Vyskytuje se v pohořích Argentiny, až do nadm. výšky 1500m. Druhové jméno pojmenováno po znalci kaktusové flory (Baldi). Dorůstá výšky i šířky 8cm. Tělo rostliny je šedé až modrozelené, zploštěle kulovité o průměru cca 5cm, hrbolcovitě zploštělé a z areol vyrůstá 5 - 7 světle béžových trnů. Kvete růžově fialově červenými květy délky 5cm. Semena drobná (1,5mm) uložená v praskajícím semeníku.

Pěstování v našich kulturách nečiní žádné potíže. Zimovat bez vody při teplotě 10°C.

Gymnocalycium bayrianum

synonyma: G. spegazzinii subsp. bayrianum

Gymnocalycium bicolor

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. simplex

Gymnocalycium bodenbenderianum

synonyma: Echinocactus bodenbenderianum, Echinocactus bodenbenderianus, G. asterium var. paucispinum, G. intertextum, G. moserianum, G. piltziorum, G. riojense, G. riojense subsp. kozelskianum, G. riojense subsp. paucispinum, G. riojense subsp. piltziorum, G. riojense var. guasayanense, G. riojense var. guthianum, G. riojense var. mirandaense, G. riojense var. pipanacoense, G. riojense var. platygonum, G. riojense var. sanjuanense, G. stellatum subsp. occultum, G. stellatum var. paucispinum

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bodenbenderianum
- subsp. intertextum

Gymnocalycium borthii

Gymnocalycium brachyanthum

Gymnocalycium brachypetalum

Gymnocalycium bruchii

synonyma: Echinocactus lafaldensis, G. albispinum, G. andreae subsp. carolinense, G. bruchii f. cristata, G. bruchii subsp. lafaldense, G. bruchii subsp. pawlovskyi, G. bruchii subsp. susannae, G. bruchii var. brigittae, G. bruchii var. glaucum, G. bruchii var. niveum, G. carolinense, G. lafaldense, G. lafaldense f. albispinum, G. lafaldense f. deviatum, G. lafaldense f. enorme, G. lafaldense f. evolvens, G. lafaldense f. fraternum, G. lafaldense f. hossei

oblasti: Argentina

Pochází z horských oblastí Argentiny. Vytváří velké množství odnoží. Ostny mají bílou barvu. Kvete růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albispinum'
- 'Brigitae'
- 'Lafaldense'
- 'Niveum'

Při suchu odolává i mrazu.

Gymnocalycium buenekeri

Gymnocalycium calochlorum

synonyma: Echinocactus calochlorus, Echinocactus prolifer, G. calochlorum var. proliferum, G. proliferum, G. proliferum var. calochlorum, G. quehlianum var. calochlorum

Gymnocalycium capillaense

Gymnocalycium capillense

synonyma: Echinocactus capillaense

Gymnocalycium cardenasianum

Gymnocalycium carminanthum

Gymnocalycium castellanosii

synonyma: G. bozsingianum, G. castellanosii subsp. bozsingianum, G. castellanosii var. armillatum, G. castellanosii var. bozsingianum, G. castellanosii var. rigidum

Gymnocalycium catamarcense

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. acinacispinum
- subsp. catamarcense
- subsp. schmidianum

Gymnocalycium chiquitanum

synonyma: G. hammerschmidii

Gymnocalycium chubutense

Gymnocalycium coloradense

Gymnocalycium deeszianum

Gymnocalycium delaetii

Gymnocalycium denudatum

synonyma: Echinocactus denudatus, Echinocactus denudatus f. delaetianus, Echinocactus denudatus f. octogonus, Echinocactus denudatus var. intermedius, Echinocactus denudatus var. leheideliana, Echinocactus denudatus var. octogonus, Echinocactus intermedius, Echinocactus megalothelon, G. megalothelon

oblasti: J Brazílie, S Argentina

Roste na hranicích Brazílie a Argentiny v trsnatém tmavě zeleném kulovitém habitu. Dorůstá výšky 8cm a šířky 15cm. Ostny jsou řídké, zpětně ohnuté a žlutě okrové. Kvete bílými až růžovými široce trubkovitými květy o průměru do 8cm. Plody jsou eliptické a zelené. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Jan Šuba'

- 'Roseiflorum'

Gymnocalycium dubniorum

Gymnocalycium erinaceum

synonyma: G. erinaceum var. paucisquamosum

Gymnocalycium erolesii

Gymnocalycium eurypleurum

Gymnocalycium eytianum

synonyma: G. friedrichii subsp. eytianum, G. pflanzii var. eytianum

Gymnocalycium ferox

Gymnocalycium ferrari

Gymnocalycium fischeri

synonyma: G. fischeri subsp. suyuquense

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny. Tělo je ploché, o průměru 8 - 15cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. suyuquense - kulovité až 8cm tělo

Gymnocalycium fleischerianum

oblasti: Bolívie, Brazílie

Naleziště uváděno v Brasílii a Bolívii. Druhové jméno pojmenováno po nestoru brněnských kaktusářů p. Zdeňku Fleischerovi. Tělo rostliny je kulovité, v průměru až 6cm, mírně zploštělé. Květ je v barvě bílé, s nádechem růžových špiček okvětních lístků, dosahuje v průměru až 5cm. Semena černá, uložená v praskajícím semeníku.

Pěstování v našich kulturách nečiní žádné potíže. Zimovat bez vody při teplotě 10°C

Gymnocalycium frankianum

Gymnocalycium gaponii

synonyma: G. gaponii subsp. geyeri

Gymnocalycium gerardii

Gymnocalycium gibbosum

synonyma: Cactus gibbosus, Cactus reductus, Cereus gibbosus, Echinocactus brachypetalus, Echinocactus gibbosus, Echinocactus gibbosus f. fennellii, Echinocactus gibbosus f. ferox, Echinocactus gibbosus f. leonensis, Echinocactus gibbosus f. leucacanthus, Echinocactus gibbosus f. leucodictyus, Echinocactus gibbosus f. nobilis, Echinocactus gibbosus f. schlumbergeri, Echinocactus gibbosus var. cerebriformis, Echinocactus gibbosus var. chubutensis, Echinocactus gibbosus var. fennellii, Echinocactus gibbosus var. ferox, Echinocactus gibbosus var. leonensis, Echinocactus gibbosus var. leucacanthus, Echinocactus gibbosus var. leucodictyus, Echinocactus gibbosus var. nobilis, Echinocactus gibbosus var. pluricostatus, Echinocactus gibbosus var. polygonus, Echinocactus gibbosus var. schlumbergeri, Echinocactus leeanus, Echinocactus leucodictyus, Echinocactus mackieanus, Echinocactus reductus, Echinocactus spegazzinii, Echinopsis gibbosa, G. brachypetalum, G. chubutense, G. gibbosum f. cerebriforme, G. gibbosum subsp. ferdinandii, G. gibbosum subsp. ferox, G. gibbosum subsp. gastonii, G. gibbosum subsp. radekii, G. gibbosum subsp. radovanii, G. gibbosum var. brachypetalum, G. gibbosum var. cerebriformis, G. gibbosum var. chubutense, G. gibbosum var. nigrum, G. leeanum, G. mackieanum, G. reductum, G. reductum subsp. leeanum, G. reductum var. leeanum, G. reductum var. leucodictyon

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. ferox
- subsp. gibbosum
- var. leucanthum
- var. nobile

Gymnocalycium glaucum

Gymnocalycium guanchinense

Gymnocalycium harridispinum

Gymnocalycium horstii

synonyma: *G. horstii* subsp. *megalanthum*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Dorůstá výšky 8cm a šířky 10cm. Tělo je tmavě zelené, kulovité a trny světle žluté. Kvete růžovými květy. Plody jsou eliptické a zelené.

Gymnocalycium hossei

synonyma: *Echinocactus hossei*

Gymnocalycium hybopleurum

synonyma: *G. ambatoense*, *G. ambatoense* subsp. *plesnikii*, *G. catamarcense* subsp. *acinacispinum*, *G. catamarcense* subsp. *schmidianum*, *G. curvispinum*, *G. nigriareolatum*, *G. nigriareolatum* f. *carmineum*, *G. nigriareolatum* var. *densispinum*, *G. nigriareolatum* var. *simoi*

Gymnocalycium hyptiacanthum

synonyma: *Echinocactus hyptiacanthus*, *G. platense* var. *hyptiacanthum*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *citriflorum*
- subsp. *hyptiacanthum*
- subsp. *paucicostatum*
- subsp. *schroederianum*

Gymnocalycium intertextum

synonyma: *G. bodenbenderianum* subsp. *intertextum*, *G. intertextum* f. *moserianum*, *G. kozelskyanum*

Gymnocalycium jochumii

synonyma: *G. jochumii* var. *jugum*

Gymnocalycium kieslingii

synonyma: *G. kieslingii* f. *alboareolatum*, *G. kieslingii* f. *castaneum*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Albiareolatum'

Gymnocalycium knollii

Gymnocalycium kroenleinii

Gymnocalycium kuehhasii

Gymnocalycium kurtzianum

Gymnocalycium lafaldense

Gymnocalycium leeanum

Gymnocalycium leptantum

Gymnocalycium marsoneri

synonyma: G. fricianum, G. hamatum, G. knebeli, G. matoense, G. megatae, G. onychacanthum, G. pseudomalacocarpus, G. tudaе

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. marsoneri
- subsp. matoense

Gymnocalycium mazanense

synonyma: Echinocactus rhodantherus, G. mazanense var. rhodantherum, G. nidulans, G. rhodantherum, G. rhodantherum var. cinerascens, G. weissianum

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cinereum
- var. ferox

Gymnocalycium megalothelos

oblasti: Paraguay

Naleziště uváděno v Paraguay. Druhové jméno odvozeno od latinského megalothelos (s velkými bradavkami). Tělo rostliny je silně zploštělé, kulovité. Žeber v průměru 10 dělených příčnými zářezy. Květy tvaru nálevkovitého o velikosti 5cm v barvě bílé až do růžova. Semena uložena v praskajícím žlutém plodu.

U nás pěstujeme v propustném substrátu, ve stínu. V zimě bez zálivky a při teplotách okolo 10°C.

Gymnocalycium mesopotamicum

Gymnocalycium mihanovichii

synonyma: Echinocactus mihanovichii, G. mihanovichii var. albiflorum, G. mihanovichii var. filadelfiense, G. mihanovichii var. friedrichii, G. mihanovichii var. stenogonum, G. stenogonum

oblasti: Paraguay

Roste v Paraguayi. V drtivé většině jsou roubovány na Hylocereus. Znáte je ze supermarketů jako barevná (typicky červená, oranžová nebo růžová) zakončení kaktusových podnoží v různých tvarech. Tělo je šedo zelené, kulovité, průměru 5cm, mají 8 žeber s vodorovným žlábkem a z areol vyrůstají krátké hnědožluté trny. Kvete růžovými nebo žlutozelenými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. filadelfiense
- var. friedrichi
- 'Red Head'/'Hibotan' - červený
- 'Japan'
- var. robustior
- var. stenogonum
- 'Variegatum' - tělo asymetricky červeně a bronzově skvrnitě

Zimuje při min. teplotě 10°C.

Gymnocalycium miltii

Gymnocalycium monvillei

synonyma: Echinocactus monvillei, Echinocactus multiflorus, Echinocactus multiflorus f. albispinus, Echinocactus multiflorus f. parisiensis, Echinocactus multiflorus var. albispinus, Echinocactus multiflorus var. hybopleurus, Echinocactus multiflorus var. parisiensis, Echinocactus ourselianus, Gymnocalycium ourselianum, G. brachyanthum, G. grandiflorum, G. megalothelon var. susannae, G. monvillei f. villamercedense, G. monvillei subsp. brachyanthum, G. monvillei subsp. gertrudae, G. monvillei var. chacrasense, G. monvillei var. coloratum, G. monvillei var. confusa, G. monvillei var. echinatum, G. monvillei var. gertrudae, G. monvillei var. grandiflorum, G. monvillei var. kainradliae, G. monvillei var. orientale, G. monvillei var. steineri, G. multiflorum, G. multiflorum var. albispinum, G. multiflorum var. hybopleurum, G. multiflorum var. ourselianum, G. multiflorum var. parisiense, G. schuetzianum

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. achirasense
- subsp. brachyanthum
- subsp. horridispinum
- subsp. monvillei
- var. steineri

Gymnocalycium mostii

synonyma: *Echinocactus kurtzianus*, *Echinocactus mostii*, *G. kurtzianum*, *G. mostii* f. *kurtzianum*, *G. mostii* var. *immemoratum*, *G. mostii* var. *kurtzianum*, *G. mostii* var. *miradorensense*

oblasti: Argentina

Naleziště uváděno v Argentině na kamenitých svazích provincie Cordoba. Druhové jméno pojmenováno po dodavateli kaktusů (Carlos Most), který dodával kaktusy z okolí Cordoby do Berlínské botanické zahrady. Tělo rostliny je ploše kulovité, solitérní. Stonky jednotlivých rostlin mohou dosahovat průměru 15cm, při výšce 10cm. Květy o velikosti až 7cm jsou v barvě bílé s nádechem růžovým při bázi okvětních lístků.

Pěstování v našich podmínkách nečiní žádné potíže. Zimovat stejným způsobem jako ostatní *G.*

Gymnocalycium mucidum

synonyma: *G. capillense* var. *mucidum*, *G. capillense* var. *sigelianum*, *G. ferrarii*, *G. ferrarii* subsp. *evae*, *G. glaucum*, *G. glaucum* subsp. *albertovojtechii*

Gymnocalycium multiflorum

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *albispinum*
- var. *parisiense*

Gymnocalycium nataliae

Gymnocalycium netrelianum

Gymnocalycium neuhuberi

Gymnocalycium nidulans

Gymnocalycium nigriareolatum

oblasti: Argentina

Rostliny rostou v Argentině v pohoří Sierra Ambato v Catamarce v n. výšce 800m. V překladu druhové jméno latinského názvu znamená s černými areolami. Rostliny rostou soliterně, to znamená, že neodnožují. Tělo rostliny je kulovité v průměru až 15cm, zploštělé, rozdělené 10ti žebry. Květ je barvy bílé. Černá semena jsou uložena v praskajícím plodu a mají barvu matně černou. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *carmineum*

Pěstování v našich podmínkách nečiní potíží. Zimovat při 10°C.

Gymnocalycium obductum

synonyma: *G. ragonesei*, *G. ragonessii*

Gymnocalycium ochoterenae

synonyma: *G. ochoterenae* subsp. *cinereum*, *G. ochoterenae* subsp. *herbsthoferianum*, *G. ochoterenae* var. *cinereum*, *G. ochoterenae* var. *polygonum*, *G. ochoterenae* var. *scoparium*, *G. vatteri*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *albispinum*
- subsp. *herbsthoferianum*
- var. *nigrispinum*
- subsp. *ochoterenae*
- subsp. *vatteri*

Gymnocalycium oenanthemum

synonyma: *G. carminanthum*, *G. carminanthum* var. *montanum*, *G. oenanthemum*, *G. tillianum*

oblasti: Argentina

Rostliny pochází z Argentiny. V překladu latinského názvu znamená vínově červený. Je odvozeno od krásně zbarveného květu. Jednotlivé rostliny dosahují v průměru až 10cm a výšky 8cm. Semena dozrávají v semeníku a jsou v barvě černé o velikosti 1mm.

V našich podmínkách pěstujeme v propustném substrátu, zimujeme jako ostatní *G.*, bez zálivky a při teplotách kolem 10°C.

Gymnocalycium paediophilum

Gymnocalycium papschii

Gymnocalycium paraguayense

synonyma: *Echinocactus denudatus* f. *andersohnianus*, *Echinocactus denudatus* f. *bruennowianus*, *Echinocactus denudatus* f. *heuschkehlmanus*, *Echinocactus denudatus* f. *meiklejohnianus*, *Echinocactus denudatus* f. *roseiflorus*, *Echinocactus denudatus* f. *scheidelianus*, *Echinocactus*

denudatus f. wagnerianus, Echinocactus denudatus f. wiedzianus, Echinocactus denudatus var. andersohnianus, Echinocactus denudatus var. anisitsii, Echinocactus denudatus var. bruennowianus, Echinocactus denudatus var. brumoviana, Echinocactus denudatus var. delaetianus, Echinocactus denudatus var. golzianus, Echinocactus denudatus var. heuschkelianus, Echinocactus denudatus var. meiklejohnianus, Echinocactus denudatus var. paraguayensis, Echinocactus denudatus var. roseiflorus, Echinocactus denudatus var. scheidelianus, Echinocactus denudatus var. wagnerianus, Echinocactus denudatus var. wiedzianus, Echinocactus paraguayensis, G. fleischerianum, G. paraguayense f. fleischerianum

Gymnocalycium parvulum

synonyma: Echinocactus platensis var. parvulum, G. berchtii, G. platense var. parvulum

Gymnocalycium pazoutianum

V přírodě se nevyskytuje, protože se jedná o hybrid vypěstovaný olomouckým kaktusářem p. Janem Šubou. Druhové jméno pojmenováno po Ing. Fr. Pažoutovi, pražském znalci na rod Gymnocalycium (1909 - 1975). Tělo kaktusu je kulovitě zploštělé o průměru až 5cm. Květ dosahuje v průměru až 5cm a je v barvě růžové se žlutými tyčinkami.

Pěstování v našich podmínkách nečiní žádné potíže. Zimovat stejným způsobem jako ostatní G.

Gymnocalycium pediophylum

Gymnocalycium pflanzii

synonyma: Echinocactus pflanzii, G. chuquisacanthum, G. comarapense, G. izozogsii, G. lagunillasense, G. marquezii, G. millaresii, G. pflanzii subsp. argentinense, G. pflanzii var. albipulpa, G. riograndense, G. zegarrae

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. albipulpa
- subsp. argentinense
- subsp. dorisiae
- var. izozogsii
- var. lagunillasense
- var. millaresii
- subsp. pflanzii
- var. riograndense
- var. zegarrae

Gymnocalycium platense

synonyma: Echinocactus baldianus, Echinocactus bodenbenderianus, Echinocactus gibbosus var. platensis, Echinocactus gibbosus var. ventanicola, Echinocactus platensis, Echinocactus platensis var. parvulus, Echinocactus quehlianus, Echinocactus stellatus, Echinocactus stenocarpus, G. platense var. ventanicola, G. quehlianum var. stellatum, G. reductum var. platense, G. reductum var. schatzlianum, G. schatzlianum, G. stellatum

Gymnocalycium poeschlii

Gymnocalycium prochazkanum

oblasti: Argentina

Pochází z Argentiny. Tělo je kulovité, nahoře zploštělé. Dorůstá výšky 4 - 6cm a šířky 6 - 7cm.

Gymnocalycium pugionacanthum

synonyma: G. catamarcense, G. catamarcense f. belenense, G. catamarcense f. belense, G. catamarcense f. ensispinum, G. catamarcense f. montanum

Gymnocalycium quehlianum

synonyma: Echinocactus platensis var. quehlianus, Echinocactus platensis var. terweemeanus, Echinocactus quehlianus, G. amoenum, G. parvulum subsp. amoenum, G. parvulum subsp. huettneri, G. parvulum var. amoenum, G. quehlianum var. rolfianum, G. quehlianum var. terweemeanum, G. quehlianum var. zantnerianum, G. stellatum var. flavispinum, G. stellatum var. kleinianum, G. stellatum var. zantnerianum, G. terweemeanum

oblasti: Córdoba

Naleziště je uváděno Cordoba v Argentině. Toto G. je pojmenováno na počest Leopolda Quehla. Tělo rostliny je ploše kulovité o výšce 5cm průměru 6 - 8cm, vybarvené do červeno hněda s 15ti žebry, temeno rostliny je propadlé a trny jsou světle hnědé. Kvete bílými nálevkovitými květy s narůžovělým středem o průměru 6cm. Semena (1mm) jsou uložena v praskajícím plodu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. albispina
- var. zantnerianum

Rostliny pěstované u nás nečiní potíže a proto se doporučují začátečníkům. Zimovat obvyklým způsobem jako ostatní G.

Gymnocalycium ragonesei

synonyma: G. asterium var. minimum, G. obductum, G. stellatum var. minimum, G. stellatum var. obductum

Gymnocalycium raineri

Gymnocalycium rauschii

Gymnocalycium reductum

synonyma: Cereus reductus

Gymnocalycium riojense

synonyma: *G. kozelskianum*, *G. platygonum*, *G. triacanthum*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *guasayanense*
- subsp. *kkozelskianum*
- subsp. *paucispinum*
- subsp. *piltziorum*
- subsp. *platygonum*
- subsp. *riojense*

Gymnocalycium riteranum

Gymnocalycium ritterianum

Gymnocalycium robustum

Gymnocalycium rosae

Gymnocalycium saglionis

synonyma: *Echinocactus hybogonus*, *Echinocactus saglionis*, *G. saglione*

oblasti: SZ Argentina

Domovinou těchto *G.* je pohoří Kordiller v severozápadní Argentině. Je pojmenováno po francouzském kaktusáři J. Saglionovi. Tělo rostliny je ploše kulovité, vysoké 10cm, široké až 30cm, má i více než 30 žebér s hnědočervenými trny a zpravidla se 3mi středovými. Květy na vrcholu nálevkovitými bílými až světle růžovými cizosprašnými květy. Rostliny kvetou až v pozdějším věku. Semena o velikosti 1mm uložena v dužnatém semeníku o velikosti 2cm a zbarveném do červena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *albispinum*
- var. *longispinum*
- var. *nigrispinum*
- subsp. *saglione*
- subsp. *tilcarensense*

Pěstování v naší kultuře nečiní žádné potíže. Zimovat bez vody při 10°C.

Gymnocalycium sanluisense

Gymnocalycium schatzlianum

Gymnocalycium schickendantzii

synonyma: *Echinocactus schickendantzii*, *G. antherostele*, *G. joossensianum*, *G. michoga*, *G.*

pungens, *G. schickendantzii* subsp. *periferalium*, *G. schickendantzii* var. *pectinatum*

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *pungens*

Gymnocalycium schroederianum

synonyma: *G. hyptiacanthum* subsp. *schroederianum*

Gymnocalycium schuetzianum

Gymnocalycium sigelianum

Gymnocalycium spegazzinii

synonyma: *G. horizonthalonium*, *G. loricatum*, *G. spegazzinii* f. *unguispinum*, *G. spegazzinii* subsp. *sarkae*, *G. spegazzinii* var. *punillense*

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bayrianum*
- subsp. *cardenasianum*
- 'Horizonthalonium'
<!-- attachment management -->

Gymnocalycium stellatum

synonyma: *G. asterium*, *G. occultum*

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *stellatum*
- subsp. *occultum*

Gymnocalycium stenopleurum

synonyma: *G. eytianum*, *G. friedrichii*, *G. mihanovichii* var. *friedrichii*

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *albiflorum*
- var. *moserianum*

Gymnocalycium striglianum

synonyma: *G. striglianum* subsp. *aeneum*, *G. striglianum* subsp. *otmari*

Gymnocalycium stuckertii

synonyma: *Echinocactus stuckertii*

Gymnocalycium sutterianum

Gymnocalycium tanningaense

synonyma: G. lukasikii, G. tanningaense subsp. fuschilloi, G. tanningaense var. lukasikii

Gymnocalycium tilcareense

Gymnocalycium tillianum

oblasti: Argentina

Roste v Argentině. Dorůstá výšky 10cm a šířky 15cm. Stonek má dlouhé bílé až tmavě hnědé trny. Kvete růžovými květy. Plody jsou kulovité.

Gymnocalycium uebelmannianum

Gymnocalycium uruguayense

synonyma: G. artigas, G. guerkeanum, G. melanocarpum

Gymnocalycium valnicekianum

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. valnicekianum
- var. polycentralis
- subsp. prochazkianum

Gymnocalycium villamercedense

Gymnocalycium walteri

Gymnocalycium weissianum

Gymnocalycium zegarrae

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. coquimbana
- subsp. millaresii
- subsp. zegarrae

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/gymnocalycium-cardenasianum>

http://www.cact.cz/kaktusy/praxe_2.htm

<http://www.celysvet.cz/kaktus-gymnocalycium.php>

<http://www.chovatelka.cz/pokojove-rostliny-clanek/gymnocalycium-charakteristika-a-zakladni-rady-pro--45/>

<https://www.rostliny.net/>