

Sorindeia

čeleď: Anacardiaceae

Sorindeia africana

synonyma: *S. africana* var. *lastoursvillensis*, *S. befalensis*, *S. crassifolia*, *S. ferruginea*, *S. kimuenzae*, *S. lamprophylla*, *S. lastoursvillensis*, *S. lemairei*, *S. letestui*, *S. maxima*, *S. multifoliolata* var. *watsaensis*, *S. nitidula*, *S. ochracea*, *S. revoluta*, *S. tchibangensis*, *S. tessmannii*, *Thyrsodium africanum*

oblasti: Afrika

Sorindeia gillettii

Sorindeia gossweileri

Sorindeia grandifolia

synonyma: *S. acutifolia*, *S. ledermannii*, *S. longipetiolulata*, *S. protioides*, *S. reticulata*, *S. schroederi*, *S. schweinfurthii*, *S. warneckei*, *S. zenkeri*

Sorindeia juglandifolia

synonyma: *Dacryodes dahomensis*, *Dupuisia juglandifolia*, *Sapindus simplicifolius*, *S. adolfi-friedericici*, *S. afzelii*, *S. claessensii*, *S. collina*, *S. heterophylla*, *S. katangensis*, *S. ngouniensis*, *S. obtusifoliolata* var. *parvifoliolata*, *S. poggei*, *S. rhodesica*, *S. ripicola*, *S. simplicifolia*, *S. sparanoi*, *S. submontana*, *S. thollonii*, *S. undulata*

oblasti: J Afrika

Pochází z jižní Afriky. Roste v podobě popínavého keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky až 9m. Bokra je šedá až nahnědlá. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 5 - 9ti vstřícnými nebo střídavými lístky obvejčitého až eliptického tvaru s krátkou špičkou a zúženou až zabolenou bází, kožovitého povrchu, zelené barvy, celokrajného zvlněného okraje, nápadné je střední žebro ze spodní strany, řapíčky jsou dlouhé 0,3 - 1cm, celková délka listu je do 22cm a šířka do 11cm. Kvete drobnými béžovými až růžovými květy v řídkých hlávkách nebo latách o délce až 70cm. Vlastní květy jsou 5tičetné a kalich pohárkovitý. Plodem je široce eliptická 1cm peckovice.

Sorindeia lundensis

Sorindeia madagascariensis

synonyma: *Bursera acutifolia*, *Mangifera pinnata*, *Rhus vernix*, *S. elongata*, *S. glaberrima*, *S. heterandra*, *S. pinnata*, *S. usambarensis*

oblasti: Keňa, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Somálsko, Tanzánie

Roste v Somálsku, Keni, Tanzánii, Malawi, Mosambikku a Madagaskaru v podobě stálezeleného

stromu. Dorůstá výšky 8 - 25m. Borka je šedohnědá a odlupuje se. Listy jsou zpeřené, tvořené 7 - 15ti střídavými lístky s asymetricky klínovitou bází, zaobleným nebo zašpičatělým koncem, délkou 9 - 23cm a šířkou 3 - 10cm. Kvete žlutými při bázi narůžovělými květy v latách o délce 20 - 95cm na starém dřevě. Okvětní lístky jsou dlouhé 2 - 4mm. Plody jsou eliptické, oranžové, dlouhé 1,5 - 2,5cm.

Sorindeia mayumbensis

Sorindeia winkleri

synonyma: *S. claessensii* var. *monticola*, *S. immersinervia*, *S. mildbraedii*, *S. rubriflora*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3092>

<https://www.rostliny.net/>