

Alnus x pubescens (Olše plstnatá)

synonyma: *Alnus glutinosa* var. *pubescens*, *Alnus incana* var. *glabrescens*, *Alnus incana* var. *pubescens*, *Alnus x ambigua*, *Alnus x badensis*, *Alnus x balatonialis*, *Alnus x beckii*, *Alnus x beckii* var. *figertii*, *Alnus x hybrida*, *Alnus x hybrida* f. *badensis*, *Alnus x hybrida* var. *intermedia*, *Alnus x hybrida* var. *pomeranica*, *Alnus x hybrida* var. *viridior*, *Alnus x montana*, *Alnus x spuria*, *Alnus x spuria* f. *viridior*, *Alnus x spuria* subsp. *beckii*, *Alnus x spuria* subsp. *tauschiana*, *Alnus x spuria* var. *figertii*, *Alnus x spuria* var. *hybrida*, *Alnus x spuria* var. *intermedia*, *Alnus x tauschiana*, *Alnus x tauschiana* var. *hybrida*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Střední Evropa

Kříženec *A. glutinosa* a *A. incana*. Roste ve střední Evropě v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Borka je ve spodní části kmene podélně rozpraskaná, zbytek je hladký. Listy nejsou lepivé, jsou obvejčité až vejčité, asymetricky pilovité až mírně zvlněně laločnaté, tmavězelené, dlouhé 3 - 6cm, báze kulatá až klínovitá, spodní strana bledězelená až modrozelená, mírně ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm.

<https://www.rostliny.net/>