

Gaylussacia baccata (Borůvkovník bobulovitý)

synonyma: Adnaria resinosa, Andromeda baccata, Decachaena baccata, Decachaena baccata var. glaucocarpa, Decamerium resinosum, G. f. glaucocarpa, G. f. leucocarpa, G. var. glaucocarpa, Gaylussacia resinosa, Gaylussacia resinosa f. leucocarpa, Gaylussacia resinosa var. glaucocarpa, Gaylussacia resinosa var. leucocarpa

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste Severní Americe v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,75 - 1m a šířky 1,5 - 2m. Listy jsou eliptické, podlouhlé, horní strana je světlezelená, spodní je žlutě tečkovaná a lepkavá, celková délka dosahuje 2,5 - 5cm. Podzimní barva je sytě červená. Kvete baňkovitými červenými vysícími 5mm květy v hustých hroznech o délce 1 - 2,5cm. Plody jsou, jedlé, sladké, kulovité, široké 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>