

Gaylussacia dumosa (Borůvkovník křovištní)

synonyma: Adnaria dumosa, Decamerium dumosum, Decamerium hirtellum, Decamerium hirtellum f. minimum, Decamerium hirtellum var. griseum, Gaylussacia dumosa, G. var. humilis, Gaylussacia hirtella, Lasiococcus dumosus, Vaccinium dumosum, Vaccinium dumosum var. humile

čeleď: Ericaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste na východě při pobřeží Severní Ameriky v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,25 - 0,5 (i 0,75)cm a šířky 0,5 - 1m. Kmen je plazivý, při zemi žláznatě ochlupený. Větve jsou žláznatě ochlupené. Je větvený již od země. Listy jsou podlouhle obvejčité, kožovité, přisedlé, na horní straně lesklé, na spodní žláznatě ochlupené, dlouhé 2,5 - 4cm. Kvete v převislém hroznu narůžovělými zvonkově tvarovanými kvítky délky 5 - 7mm. Plodem je černá 6 - 8mm peckovice bez chuti.

Vyhovují mu chudé písčité vlhké půdy.

Množí se semeny, řízky nebo hřížením.

<https://www.rostliny.net/>