

# Cotoneaster subacutus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán

Roste v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2,5m. Větve jsou vzpřímené, rozkladité, větve jsou štíhlé, hnědé, s lenticelami, drobně bradavčité, v mládí ochlupené. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích široce eliptické až zaokrouhlené, na konci zakulacené, tupé nebo špičaté, báze široce klínovitá, horní strana tmavězelená, matná, téměř holá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, spodní strana je hustě ochlupená, řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm, celková délka je 2,5 - 2,8cm a šířka 1,7 - 2,1cm. Květenství je kompaktní, 7 - 13tičetné. Květy mají 0,3 - 1cm stopky, pohárkovitou češuli, kališní lístky špičaté, okraj huňatý, poupata bílá, koruna velikosti 0,9 - 1cm, korunní lístky rozložené. Plody jsou kulovité nebo obvejčité, ojněné, huňaté a velké 8 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>