

Lloydia serotina (Lilijka pozdní)

synonyma: Anthericum serotinum, Bulbocodium autumnale, Bulbocodium serotinum, Cronyxium serotinum, Gagea serotina, Ornithogalum serotinum, Phalangium serotinum, Rhabdocrinum serotinum

čeleď: Liliaceae

oblasti: Aljaška, Alpy, Arunáčalpradéš, Bhútán, Britská Kolumbie, Čína, Himálaj, Idaho, Japonsko, Karpaty, Kašmír, Kavkaz, Kazachstán, Kolorado, Korea, Mongolsko, Montana, Německo, Nepál, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rusko, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Švýcarsko, Ťan-šan, Utah, Velká Británie, Washington, Wyoming, Yukon

Roste kolem severního pólu jako trvalka, nejjihnější místa výskytu jsou Alpy, Karpaty, Kavkaz, hory střední Asie a Skalisté hory. Dorůstá výšky (2 -) 5 - 12 (i 25)cm. Pod zemí vytváří podlouhlou cibulku délky 1,5 - 10cm a šířky 0,5 - 1,2cm. Lodyha je přímá, nevětvená. Vytváří pouze 2 přízemní čárkovité listy délky (4 -) 10 - 20cm, šířky 1 - 2mm, lodyžních listů je 3 - 4ks, délky 0,3 - 3cm a šířky 0,5 - 3mm. Kvete nálevkovými 6tičetnými bílými květy se žlutou bází a růžově červenými žilkami o celkové délce 1 - 2cm, šířce 4 - 8mm v 2 (i 4)kvěťem hroznů. Plodem je kulovitá 6tilaločná tobolka délky 7 - 8mm, šířky 6 - 8mm a obsahuje 3hranná semena délky 2mm a šířky 1mm.

Vyhovují jí skalní pukliny, vlhké sutě, atp.

<https://www.rostliny.net/>