

Coptis trifolia

synonyma: *Anemone groenlandica*, *Chryza borealis*, *C. var. semiplena*, *Helleborus trifolius*

čeleď: Ranunculaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Grónsko, Indiana, Japonsko, Kamčatka, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, S Asie, Saskatchewan, Severní Karolína, SV Sibiř, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste od Severní Ameriky po severovýchodní Asii. Patří mezi drobné trvalky. Pod zemí vytváří oranžový oddenek. Dorůstá výšky 3 - 17cm. Listy jsou malé, přízemní, hluboce 3laločné a stálezelené, tmavězelené, obvejčité, s klínovitou bází, pilovým koncem, přisedlé nebo krátce řapíkaté, lesklé a dlouhé 1 - 2cm. Kvete bílými květy se 4 - 6 (i 7)ti okvětními lístky. Plodem je 4 - 7mm měchýřek zakončený zakřiveným zobánkem.

Vyhovují mu chladná vlhká místa s mechy, vrbové tundrové křovinaté porosty s půdou chudou na živiny.

<https://www.rostliny.net/>