

Meliosma pinnata

synonyma: Millingtonia pinnata

čeleď: Salicaceae

oblasti: Bhútán, Korea, Myanmar (Barma), Sikkim, Xizang (Tibet)

Roste v Koreji, Myanmaru, Indii a Číně v podobě stále zeleného (vzácně opadavého) stromu. Dorůstá výšky až 40m. Větve mají na sobě jizvy po listech. Listy jsou zpeřené, dlouhé 5 - 60cm včetně 15 - 25cm řapíku, vřeteno je oblé, tvoří je 2 - 12 párů lístků, vlastní lístky jsou okrouhlé, eliptické až kopinaté, řídce pilovité, dlouhé 1,5 - 25cm, široké 1 - 10cm, báze zaoblená nebo klínovitá, spodní strana může být ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 15 párů nervů a řapíčky jsou dlouhé do 5mm. Kvete ve vzpřímené vrcholové bohatě větvené 10 - 55 (i 70)cm latě, listeny jsou vejčité až 1cm dlouhé, stopky květů dlouhé do 4mm, poupata průměru 1,5 - 3mm, kališní lístky jsou vejčité, dlouhé 1 - 1,5mm, vnější korunní lístky jsou zakulacené. Plodem je kulovitá až obvejčitá peckovice o průměru 0,4 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *arnottiana*
- subsp. *barbulata*
- subsp. *ferruginea*
- subsp. *humilis*
- subsp. *macrophylla*
- subsp. *pendula*
- subsp. *pinnata*
- subsp. *ridleyi*
- subsp. *sylvatica*

<https://www.rostliny.net/>