

Rhynchostylis retusa

synonyma: *Aerides guttata*, *Aerides praemorsa*, *Aerides retusa*, *Aerides spicata*, *Aerides undulata*, *Anota violacea*, *Epidendrum hippium*, *Epidendrum indicum*, *Epidendrum retusum*, *Gastrochilus blumei*, *Gastrochilus garwalicus*, *Gastrochilus praemorsus*, *Gastrochilus rheedei*, *Gastrochilus spicatus*, *Gastrochilus violaceus*, *Limodorum retusum*, *Orchis lanigera*, *Rhynchostylis albiflora*, *Rhynchostylis garwalica*, *Rhynchostylis guttata*, *Rhynchostylis praemorsa*, *R. f. albiflora*, *Rhynchostylis violacea*, *Saccolabium blumei*, *Saccolabium garwalicum*, *Saccolabium guttatum*, *Saccolabium heathii*, *Saccolabium macrostachyum*, *Saccolabium praemorsum*, *Saccolabium retusum*, *Saccolabium rheedei*, *Saccolabium spicatum*, *Saccolabium violaceum*, *Sarcanthus guttatus*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Bangladéš, Benin, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam

Roste v Bangladéši, Beninu, Myanmaru, Kambodži, Číně, Indii, Indonésii, Laosu, Malajsii, Nepálu, Filipínách, Singapuru, Srí Lance, Thajsku a Vietnamu. Květenství tvoří více než 100 bílých růžově skvrnitých květů a je dlouhé až 60cm. Jedná se o státní rostlinu provincií Arunachal Pradesh a Assam.

<https://www.rostliny.net/>