

Najas marina (Řečanka přímořská)

synonyma: *Najas gracilis*, *Najas major*, *Najas major* var. *angustifolia*, *N. var. recurvata*

čeleď: Hydrocharitaceae

oblasti: Afrika, Andalusie, Arizona, Austrálie, Česká republika, Florida, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Makedonie, Michigan, Minnesota, Nebraska, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Severní Dakota, Švýcarsko, Texas, Utah, Virginie, Wisconsin

Roste ve vodě v Evropě, Asii, severní Africe, Austrálii, Severní i Jižní Americe jako dvoudomá jednoletka nebo trvalka. Stonek dorůstá délky 0,05 - 0,5 (i 1)m, šířky i více než 1mm, je ostnitý a spodní články dlouhé do 10cm. Listy jsou úzce čárkovité, okraje jsou osténkatě přímě nebo mírně zahnutě zubaté, dlouhé do 4cm, široké (1 -) 2 - 6mm a pochvy listů jsou zakulacené a mohou mít 1 - 3 ostny. Kvete drobnými jednopohlavnými květy. Plody jsou eliptické, dlouhé 2 - 5mm, široké 1 - 4mm a obsahují světlá žlutě hnědá semena. Patří mezi ohrožené druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *armata*
- subsp. *arsenariensis*
- var. *brachycarpa*
- var. *intermedia*
- subsp. *latior*
- subsp. *marina* (Řečanka přímořská pravá)
- subsp. *sumatrana*

Vyhovují ji zásadité nejlépe stojaté vody.

<https://www.rostliny.net/>