

## Phleum paniculatum (Bojínek latnatý)

synonyma: Chilochloa annua, Chilochloa aspera, Chilochloa paniculata, Phalaris paniculata, Phleum annum, Phleum asperum, Phleum asperum var. annum, Phleum asperum var. ciliatum, Phleum asperum var. japonicum, Phleum japonicum, P. subsp. annum, P. subsp. ciliatum, P. var. annum, P. var. ciliatum, Phleum viride, Plantinia aspera

čeleď: Poaceae

oblasti: Andalusie, Anglie, Ázad Kašmír, Chajbar Paštúnchwá, Írán, Itálie, Katalánsko, Německo, New York, Oregon, Paňdžáb (pakistánský), Středozemí, SZ Indie, Švýcarsko

Roste od Indie a Pákistánu po Evropu jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 30 (i 55)cm. Listy jsou zašpičatělé, dlouhé do 19cm, široké 3 - 9mm, jazýček je zašpičatělý a dlouhý 2,5 - 7mm. Květenstvím je válcovitá světle zelená lata délky 1 - 12cm, šířky 3,5 - 7mm a klásky jsou dlouhé 1,5 - 2,8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ciliatum
- var. paniculatum

<https://www.rostliny.net/>