

Blackstonia acuminata (Žlutnice špičatá)

synonyma: *Blackstonia citrina*, *Blackstonia perfoliata* subsp. *serotina*, *Blackstonia serotina*, *Centaurium serotinum*, *Chlora acuminata*, *Chlora citrina*, *Chlora serotina*

čeleď: *Gentianaceae*

oblasti: Írán, Itálie, Maďarsko, Německo, Slovensko, Středozeemí, Švýcarsko

Roste především v Evropě, dále pak ve středozemí až po Írán. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 60)cm. Povrch je ojíněný. Stonek rozvětvený a oblý. Listy jsou vstřícné, 3úhelníkovité až vejčité, dolní tupé, dlouhé 0,5 - 3cm. Lodyžní listy jsou u báze zúžené a srostlé. Kveté samostatnými květy nebo v řídkých jednostranných pavidlanech. V průměru mají 0,8 - 1cm. Plodem je 3boká tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acuminata* (Žlutnice špičatá pravá)
- subsp. *aestiva*

Vyhovují jí vlhké louky, okraje toků, kanály, atp. s písčitou nebo štěrkovitou půdou. Je tolerantní na zasolení.

<https://www.rostliny.net/>