

Blackstonia perfoliata (Žlutnice prorostlá)

synonyma: B. var. ponsii, Centaurium perfoliatum, Chironia perfoliata, Chlora mascariensis, Chlora perfoliata, Chlora sicula, Gentiana perfoliata

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Albánie, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Irsko, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Krym, Lucembursko, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Švýcarsko, V Středozemí, Velká Británie

Roste ve středozemí s přesahem do severozápadní, střední a západní Evropy. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 70)cm. Stonek je chudě větvený, holý, ojíněný, šedo-zelené barvy. Listy jsou vstřícné, celokrajné, srostlé celou bází, dlouhé 0,5 - 3 (i 4)cm a široké 1,4 - 1,8 (i 2)cm. Vytvářejí přízemní růžici. Kvete žlutými květy o průměru 0,8 - 1,5cm, mají 6 - 10 čárkovitých korunních lístků uspořádaných do spirály, trubka je dlouhá 0,5 - 5mm a vyrůstají buď samostatně nebo v řídkých 6 - 8 (i 12)tičetných vidlanech. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. grandiflora
- subsp. imperfoliata
- subsp. intermedia
- subsp. perfoliata (Žlutnice prorostlá pravá)
- subsp. serotina

Vyhovují ji louky, pastviny, okraje křovin a lesů, písčiny, úhory, okraje cest a to zejména v blízkosti moře.

<https://www.rostliny.net/>